



YaraVita™

Bortrac™ 150

注
在使用此产品前，请详读标签。专业使用者可索取安全资料表。只用于被推荐的农作物。请勿超出使用标准。

Bortrac™ 150

Boron ethanolamine

产品分析保证
10.9% = 150 克/公升水溶性硼 (B)

1 公升

净重 1.35
公斤

Distributed by: **Yara International (M) Sdn Bhd**, Lot 3.02, Level 3, 1 First Avenue, Bandar Utama 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 603 76138010

Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK
Tel: 01759 302545 Fax: 01759 303650

APPLICATION RATES AND TIMINGS

FOLIAR APPLICATION

Fruit Crops (citrus, dragon fruit, durian, guava, mango, papaya, pineapple): 1-2 ml/litre water applied just before flowering and just after flowering. Do not apply during flowering. Water rate: 1,000 L/ha. Do not exceed 2 L/ha per application.

果类(柑橘, 火龙果, 榴梿, 番石榴, 芒果, 木瓜, 黄梨): 产品用量 1 至 2 毫升配每公升水, 在开花期前与后使用。注意: 花时切忌使用。水率: 每公顷 1000 公升。每公顷每次的产品用量别超过 2 公升。

Brassicas (Chinese cabbage, kale): 3 ml/litre water applied at the 4-6 leaf stage. For moderate to severe deficiency, repeat applications at 10-14 day intervals. Water rate: 1,000 L/ha. Do not exceed 3 L/ha per application.

叶菜类(白菜, 芥兰): 产品用量 3 毫升配每公升水, 在 4 至 6 片叶期间使用。每隔 10 至 14 天重复使用给予中度至严重元素缺乏现象。水率: 每公顷 1000 公升。每公顷每次的产品用量别超过 3 公升。

Cucurbits (cucumber, water melon): 2 ml/litre water from the 4 leaf stage. Repeat at 10-14 day intervals if necessary.

Water rate: 1,000 L/ha. Do not exceed 2 L/ha per application.

瓜类(黄瓜, 西瓜): 产品用量 2 毫升配每公升水, 在 4 片叶期间使用。在必要时, 每隔 10 至 14 天重复使用。水率: 每公顷 1000 公升。每公顷每次的产品用量别超过 2 公升。

Maize: 6 ml/litre water at 4 to 8 leaf stage. For moderate to severe deficiency, a repeat application may be necessary 10 to 14 days later.

Water rate: 500 l/ha. Do not exceed 3 l/ha per application.

玉米: 产品用量 6 毫升配每公升水, 在 4 至 8 片叶期间使用。每隔 10 至 14 天重复使用给予中度至严重元素缺乏现象。水率: 每公顷 500 公升。每公顷每次的产品用量别超过 3 公升。

Oil palm: 1 ml/litre water. Three applications per year (one every 4 months). Water rate: 1000 l/ha. For Nursery (up to 2 years old): 1 ml/litre water applied every two months. Water rate: 1000 l/ha. Do not exceed 1 l/ha per application.

油棕: 产品用量 1 毫升配每公升水。每年用 3 次 (每隔 4 个月使用 1 次)。水率: 每公顷 1000 升。秧苗期 (幼苗至 2 年树): 1 毫升配每公升水, 每两个月使用一次。水率: 每公顷 1000 公升。每公顷每次的产品用量别超过 1 公升。

Rice: 2 ml/litre water applied at start of tillering.

Water rate: 500 l/ha. Do not exceed 1 l/ha per application.

水稻: 产品用量 2 毫升配每公升水。茎部分蘖期间使用。水率: 每公顷 500 公升。每公顷每次的产品用量别超过 1 公升。

Spinach: 1 ml/litre water from 4 to 6 leaf stage. Repeat at 10 to 14 day intervals as necessary. Water rate: 1000 l/ha. Do not exceed 1 l/ha per application.

菠菜: 产品用量 1 毫升配每公升水, 在 4 至 6 片叶期间使用。每隔 10 至 14 天重复使用。水率: 每公顷 1000 公升。每公顷每次的产品用量别超过 1 公升

使用提示

必须依照标签指示。
请先将产品拌水混合均匀。后将混合液体过滤, 倒入已装好四分之三清水的桶, 同时搅拌。再加入清水, 继续搅拌至喷洒完毕为止。

混合使用 - 注意事项

请仔细阅读本产品标签及严谨依照所提供之使用方式。请先查明此产品是否适合于混合其他农药或肥料使用。这混合用法有可能产生副作用或造成产品无效, 故 Yara 公司对此应用法之效果一概不负责。在此 Yara 公司建议您应先作小分量混合, 试用后再进行全用。有关试用详情, 请参阅网络 www.tankmix.com 或联络 Yara 公司询问进一步的详情。

注意事项

本产品只供使用在受推荐之农作物。避免在不良之天气下使用, 如: 迅速干旱或高度潮湿或多霜, 多雨之天气状况下。在使用此产品时, 请穿上手套及面罩。毕后, 清洗全部用过的用具。

储存

储存在阴凉, 干燥的仓库, 远离小孩及家畜能接触的地點。避免结霜及高温地点 (气候温度超过 40°C)。

销售条例 - 公司产品有限度保证及有限责任的承担

Yara 公司保证本产品之品质在未开罐前符合原料标签。使用时, 请遵守标签提供之推荐, 因这是经试测后认为有效之使用方法。但因各地气候之差距或土壤之差别所造成之非理想效果乃非为 Yara 公司所能控制, 故不为本公司之责任范围内。购买者将承担一切在储存及使用本产品之风险。本产品之销售乃是依据英国 Yara 购买或使用将自动接受此销售条例。