



**YaraVita™**

**Brassitrel Pro™**

# Brassitrel Pro™

**HR** UPOZORENJE

Prije korištenja proizvoda obavezno pročitati uputu za upotrebu.

**PFC 1(C)(I)(b)(i) Jednostavna tekuća anorganska gnojiva s makrohranjivima N (Ca, Mg) 4.5 (+9, +7.6) s mikronutrijentima**  
Tekuća suspenzija

Sadržaj % po masi:

**4,5% (= 69 g/l) ukupnog dušika (N)**

[4,5% dušika uree]

**9% (= 138 g/l) ukupnog kalcijevog oksida (CaO)**

**7,6% (= 117 g/l) ukupnog magnezijevog oksida (MgO)**

**3,9% (= 60 g/l) bora (B) kao kalcijeva sol, ukupno**

**4,6% (= 70 g/l) mangan (Mn) kao karbonat, ukupno**

**0,3% (= 4 g/l) molibdena (Mo) kao natrijeva sol, ukupno**

**Sastojci:** Colemanit CAS n° 12291-65-5 (CMC 1: Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina), magnezijev hidroksid CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), mangan karbonat CAS n° 598-62-9 (CMC 1), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Koristite samo tamo gdje je naznačeno. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Ovo gnojivo sadrži ureu, koja može otpustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere sanacije.

**RS** NAPOMENA

Pre upotrebe ovog proizvoda pročitati etiketu.

**PFC 1(C)(I)(b)(i) Neorgansko đubrivo sa dva ili više mikroelemenata sa dodatkom sekundarnih elemenata**  
Tečna suspenzija

Garantovano analizom - rastvorljiv u vodi:

**4,6% = 70 g/l magnezijuma (Mg)**

**3,9% = 60 g/l bora (B)**

**4,6% = 70 g/l mangana (Mn)**

**0,3% = 4 g/l molibdena (Mo)**

**5,8% = 89 g/l kalcijuma (Ca)**

**Sastojci:** Colemanit CAS n° 12291-65-5 (CMC 1: Supstance i smeše prvobitnog materijala), magnezijum hidroksid CAS n° 1309-42-8 (CMC 1), mangan karbonat CAS n° 598-62-9 (CMC 1), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Koristiti samo gde postoji prepoznata potreba za proizvodom. Ne prekoračiti dozu primene. U zavisnosti od lokalnih uslova, moraju se preduzeti odgovarajuće mere sanacije.

Broj rešenja i nadležni organ: 321-01-00571/2017-11 od 31.03.2017.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja.

**10L**  
Neto težina:  
15,37 kg

# YaraVita™ Brassitrel™ Pro



UFI: KQ10-30V5-000P-7NJE

## HR Upozorenje

Opasni sastojci: kolemanit (kalcij borata)

H361: Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.  
P202: Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P280: Nositi zaštitne rukavice/odjeću i zaštitu za oči/lice. P261: Izbjegavati udisanje plina, dima ili raspršenih čestica. P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode. P308+P313: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Dobijte liječničku pomoć.

## RS Upozorenje

Opasni sastojci: kolemanit (kalcij borat)  
H361: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod. P202 Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/gasa/magte/para/spreja. P302+P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/... P308 + P313 U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Serijski broj: Pogledajte na pakiranju  
Datum izrade: Pogledajte na pakiranju  
Rok trajanja: 2 godina od datuma proizvodnje

Broj LOT-a : na ambalaži  
Datum proizvodnje: na ambalaži  
Rok trajanja: 2 godina od datuma proizvodnje

Uvezeno od: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém,  
Szabadság tér 4.,Hungary  
Tel: +940 577 88 36

Distribuiru za RH:

**Colić Trade d.o.o.** 23210 Biograd n/m,  
Radovanova 12, Tel: 023 662 109

**Cipro d.o.o.** Lepajci 4a, 49 000 Krapina,  
Tel: 049/382 000; [www.cipro.hr](http://www.cipro.hr)

Distribuiru u RS: **AgriMatco doo.** Narodnog Fronta  
73/1, 21000 Novi Sad  
Tel: 021/469-629 [www.agrimatco.rs](http://www.agrimatco.rs)

Proizvodi/ Proizveo: **Yara UK Ltd.**, Manor Place,  
Pocklington, York, YO42 1DN, UK.  
Tel: 01759 302545 [www.yara.co.uk](http://www.yara.co.uk)



# YaraVita™ Brassitrel™ Pro



Samo za profesionalnu upotrebu.  
Obratite se Yari za konkretnije preporuke.

## PRIMJENA/DOZE PRIMJENE

**Brokula, Cvjetača, Kupus, Prokulica,** : Do 4 l/ha što je ranije moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio (primjerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mjesec dana prije žetve. Količina vode 200l/ha.  
**Uljana repica** : 3 -4 l/ha u u fazi 4 do 9 lista i ponoviti u fazi početka brzog produljenja stabljike do početka cvatnje. Po potrebi ponoviti u intervalima od 10 do 14 dana unutar tih faza rasta. Također, 3 l / ha na kraju padanja latica. Količina vode 50 do 200l/ha.



Za daljnje savjete i informacije o proizvodu skenirajte pomoću svog pametnog telefona

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek slijedite ove upute naznačene na etiketi  
Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polagano dodajte proizvod u spremnik, preko indukcijskog lijevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

### TANK MIX Kompatibilnost (miješanje)

Strogo se pridržavati uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

### UPOZORENJE

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu, mrazu, kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju i ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladištenja.

Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe. Molimo pogledajte MSDS za dodatne informacije, dostupne na [www.yara.com](http://www.yara.com)

### SKLADIŠTENJE

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (<-5°C and <35°C), izvan dohвата djece i izvan dohвата životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

### UVJETI PRODAJE

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja, uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvaća ove uvjete prodaje.

# YaraVita™ Brassitrel™ Pro

RS

Samo za profesionalnu upotrebu.

## VREME I NAČIN PRIMENE

**Kupusnjače:** 2-4 l/ha u ranim fazama vegetacije (4-6 listova) treba primeniti po prvi put, kada biljka oformi dovoljnu lisnu masu. U slučajevima deficita tretman možemo ponoviti za 10-14 dana. Količina vode za rastvor: 200-600 l/ha.

**Uljana repica:** U jesen 2 l/ha, u proleće 2-4 l/ha od početka vegetacije do početka cvetanja (BBCH 60) i/ili po završetku cvetanja (BBCH 69) 2-3 l/ha. Količina vode za rastvor: 200 l/ha.

**Suncokret:** 2-4 l/ha, u fazi 4-8 listova ili najkasnije do početka butonizacije. Količina vode za rastvor: 200-400 l/ha



Za dalje savete i informacije o proizvodu skenirajte pomoću svog pametnog telefona

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU UVEK PRATITI INSTRUKCIJE SA ETIKETE

Proizvod temeljno promešati pre upotrebe. Sipati kroz filter u rezervoar koji je do dve trećine napunjen sa vodom, uz uključen mešač. Dopuniti vodom i nastaviti sa mešanjem dok se prskanje ne završi.

## MEŠANJE I PRIMENA

Pročitati pažljivo sve etikete, strogo se pridržavati propisanih načina upotrebe i saveta koji se odnose na mogućnost zajedničke primene sa drugim preparatima. Razni, promenljivi faktori, koji nisu pod kontrolom Yare, mogu predstavljati direktan uticaj na učinak zajedničke primene sa drugim preparatima, stoga celokupan rizik svakog mešanja i zajedničkog primenjivanja sa drugim preparatima snosi krajnji korisnik. Striktno se preporučuje da se uradi ograničena aplikacija, odnosno primena, u slučaju da se koriste mešavine sa nepoznatim proizvodima po prvi put. Pre bilo kakve zajedničke upotrebe i mešanja sa drugim preparatima, vi, ili vaš savetnik morate posetiti sajt [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) radi provere važnih informacija vezanih za mešanje proizvoda. Kao alternativa, uvek možete kontaktirati Yaru radi dobijanja konkretnih saveta.

## PREDOSTROŽNOSTI

Isključivo primenjivati na zaštićenim usevima ako je to konkretno napomenuto. Izbegavati upotrebu pod ekstremnim klimatskim uslovima, na primer u uslovima brzog sušenja, ekstremno sporim uslovima sušenja, mraza, kiše ili ukoliko se očekuju mraz ili kiša. Nositi zaštitne rukavice i maske za lice pri rukovanju sa ovim proizvodom. Oprati svu opremu pre i posle upotrebe.

## SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu specijalizovanom za skladištenje hemije, van domašaja dece i domaćih životinja. Zaštititi od smrzavanja i ostalih vremenskih uslova ( $-5^{\circ}\text{C} < i < 35^{\circ}\text{C}$ ).

## USLOVI PRODAJE

Ovaj proizvod se prodaje u skladu sa odredbama i uslovima prodaje prodavca, koji su dostupni na zahtev. Korišćenje proizvoda je prihvatanje od strane kupca Uslova prodaje.