



**YaraVita™**

**Coptrac™500**

# Coptrac™500

## HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

**PFC 1(C)(II)(a) Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervesen trágya**  
Folyékony szuszpenzió

Tartalom tömegszázalék:

**33,5% (=510 g/l) Összes réz (Cu) oxid formájában**

**4,6% (= 70 g/l) Összes nitrogén (N)** [4,6% karbamid-nitrogén]

**Összetevők:** Réz-oxid CAS n° 1317-39-1 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1), monoetilén-glikol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt adagolást. Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary.  
Tel: +36 88 577 940

## RO ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întregă etichetă.

**PFC 1(C)(II)(a) Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelement**  
Suspensie lichidă

Conținut % din masă:

**33,5% (= 510 g/l) Cupru (Cu) ca oxid, total**

**4,6% (= 70 g/l) Azot (N) total** [4,6% azot ureic]

**Compoziție:** Oxid cupros CAS n° 1317-39-1 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), uree CAS n° 57-13-6 (CMC 1), monoetilen glicol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

A se utiliza doar unde este indicat. Nu depășiți doza recomandată. Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numărul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon

Importat de: **Yara Poland Sp. Z.o.o.**, Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polonia, tel. +48 91 4330 035.

Contact local verifi cații [www.yara.ro](http://www.yara.ro)

Által termelt/ Produs de:

**Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK.  
Tel: 01759 302545 Web: [www.yara.com](http://www.yara.com)

**5 L**  
Nettó tömeg  
Greutate netă  
7,61 kg



WLUH20971 V01.24

# YaraVita™ Coptrac™500



## HU Veszély

Veszélyes alkotórészek: réz(II)-oxid

H302: Lenyelve ártalmas. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz. P280: Védőruha és szemvédő használata kötelező. P270: A termék használata közben enni, inni vagy dohányozni. P305+P351+P338+P310: SZEMBE KERÜLES ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több perccen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

## RO Pericol

Ingrediente periculoase: oxid de cupru

H302: Nociv în caz de înghițire. H318: Provoacă leziuni oculare grave. H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P391: Colectați scurgerile de produs.

## A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

**Alma:** 0,5 l/ha-os mennyiségben javasolt kijuttatni szüret után, levélhullás előtt. Vízigény: 500-1000 l/ha.

**Bab:** 0,25-0,5 liter/ha adható ki 4-6 leveles állapotban. Szükség esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Vízigény: 400-600 l/ha.

**Borsó:** 0,25 l/ha-os dózist a növény 10-15 cm-es állapotában kell kijuttatni. Vízigény: 400-600 l/ha

**Burgonya:** 0,5 l/ha alkalmazandó 7-14 nappal a teljes (100 %-os) kelést követően. Szükség esetén (levélnyelv analízis) a gumónövekedés időszaka alatt ismételjük meg a kezelést. Vízigény: 400-600 l/ha.

**Cékla:** 0,5 l/ha kijuttatása 4-6 leveles állapotban. Szükség esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.

**Vízigény:** 400-800 l/ha.

**Cseresznye:** 0,25-0,5 l/ha dózissal alkalmazható szüret után, levélhullás előtt. Vízigény: 1000 l/ha.

**Cukorrépa:** 0,5 l/ha kijuttatása 4-10 leveles állapotban. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 napos ismételjük meg a kezelést. Vízigény: 200-400 l/ha.

**Szamóca (szántóföldi termesztés):** 0,25-0,5 l/ha kijuttatása a virágzás megelőző időszakban. Vízigény: 400-600 l/ha.

**Hagyma:** a 0,5 l/ha kijuttatását a dugványozás után két héttel vagy a direkt vetésű növények esetében, a növény 15 cm-es állapotában kell elvégezni. Szükség esetén a kezelés 10-14 naponként megismételhető. Vízigény: 200-600 l/ha.

**Körte:** a 0,5 l/ha kijuttatását szüret után, lombhullás előtt kell elvégezni. Vízigény: 400-800 l/ha

**Kukorica:** 0,25-0,5 l/ha 4-8 leveles állapotban, 3 l/ha talaj kezelés esetén. Vízigény: 200-400 l/ha.

**Őszi káposztarepce:** 0,25 l/ha-os mennyiségét 4-8 leveles állapotban kell kijuttatni. Vízigény: 200-400 l/ha.

**Őszi búzánál:** 0,25-0,5 l/ha adagban alkalmazzuk 2 leveles állapottól a második nödsz megjelenéséig (Zadok's G.S. 12 to 32). Permetelt mennyiség: 200-400 l/ha. Középes vagy erős hiány esetén a kezelést 10-14 nap múlva ismételjük meg. Őszi vetésű növények esetén a téli nyugalmi állapot előtt is javasolt alkalmazása.

**Sárgarépa:** 0,25-0,5 l/ha, 15cm növény magasságtól. Hiánytünet esetén a kezelés 10-14 naponként megismételhető.

Szükséges vízmennyiség: 200 l/ha

**Saláta (szántóföldi termesztés):** 0,25 l/ha, a palántázást vagy a kelést követő 10-14. napon. Vízigény: 200-400 l/ha.

**Szőlő:** 0,5 l/ha mennyiségben a virágrügyek megjelenésekor. Vízigény: 400-1000 l/ha.

**Szilva:** 0,5 l/ha alkalmazása szüret után, lombhullás előtt. Vízigény: 1000 l/ha.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKE FELTÁJÁZÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felazánód.

Töltse fel a permetezőgépet tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

## KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználónál vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt ÖN vagy szaktanácsadója keresse fel a [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

## FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárású viszonyok közt, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrelézés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztízzon meg minden eszközt. További információkért tekintse meg a biztonságtechnikai adatlapot, amely a [www.yara.hu](http://www.yara.hu) oldalon érhető el.

## TÁROLÁS

Tárolja hővis, száraz növényvédőszer raktárban. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Ővja a fagytól és szélsőséges időjárású körülményektől (0°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

## ÉRTEKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezése alá. A termék használata feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket

# YaraVita™ Coptrac™500

## DOZE ȘI MOMENT DE APLICARE

**Ardei (în câmp):** 0,5 l/ha în faza de 4 – 6 frunze, la 35 de zile după transplantare.

Doza de apă 200 – 500 l/ha.

**Cais, Cireș, Nectarin, Prun:** 0,5 l / ha. Aplicarea după recoltare, dar înainte de căderea frunzelor. Doza de apă: 1000 l / ha.

**Cartofi:** o aplicare de 0,5 l/ha la o săptămână după apariția 100% a creșterilor vegetative(frunze). Doza de apă: 200 l/ha.

**Ceapă:** 0,5 l/ha la 15cm când frunzele sunt suficient de dezvoltate pentru a intercepta soluția. Doza de apă 200 l/ha.

**Cereale:** 0,25 - 0,5 l/ha începând cu a 2 frunză până la apariția celui de al doilea nod (G.S. 12 – 32). Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

**Conifere:** 0,5 l/ha în două aplicări, una la apariția frunzelor noi și una devreme în toamnă. Doza de apă: 500 l/ha.

**Gazon:** 0,5 l/ha primăvara devreme când începe creșterea, sau la identificarea deficiențelor. Doza de apă: 200 l/ha

**Măr, Păr:** 0,5 l/ha. Aplicarea se face după recoltare, dar înainte de căderea frunzelor. Doza de apă: 500-1000 l/ha.

**Morcov:** 0,5 l/ha la faza de 15 cm sau când frunzele sunt suficient de dezvoltate pentru a intercepta soluția. Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

**Pajiști și pășuni:** 0,5 l/ha cu 15-21 zile înainte de tăiere, A NU SE APLICA PENTRU OI. Doza de apă:200 l/ha

**Piersic:** 0,5 l/ha. Aplicare se face după recoltare, dar înainte de căderea frunzelor. Doza de apă: 1000 l/ha.

**Porumb:** 0,5 l/ha la etapa 4-8 frunze.. Doza de apă: 200 l/ha.

**Sfeclă roșie, Sfeclă zahăr:** 0,5 l/ha la etapa 4-6 frunze. Doza de apă: 200 l/ha.

**Soia:** 0,5 l/ha în faza de 4-5 frunze. Doza de apă 200l/ha.

**Tomate (în câmp):** 0,5 l/ha în faza de 4 – 6 frunze, la 35 de zile după transplantare. Doza de apă 200 – 500 l/ha.

**Vița de vie:** 0,5 l/ha înainte sa fie vizibili butonii florali. Doza de apă 200 – 1000 l/ha

**Aplicare La Sol:** 5 - 10 litri/ha înainte de pregătire sau înainte de plantare, sau înainte de reintra în vegetație cultura perenă.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### ÎN TOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

### COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare.

Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

### PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt previziuni de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire. Vă rugăm să consultați MSDS pentru informații suplimentare, disponibil la [www.yara.com](http://www.yara.com).

### DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (0°C și <35°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

### CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.