



YaraVita™
Ferritrac 54™

Ferritrac 54™

AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

PFC 1(C)(II)(a) Engrais minéral simple à oligo-élément
Solution liquide

Analyse % en masse :

3,9 % (= 54 g/l) Fer (Fe) soluble dans l'eau
3,9% de fer chélaté, 1,5% chélaté avec o,o EDDHA

Fraction o-o chélaté stable du pH 4 au pH 10

Ingrédients: Fer EDDHA CAS n° 16455-61-1 (CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges), monoéthylène glycol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.

Numéro de lot / Date de fabrication: Sur le dessus de l'emballage

Importé par: **Yara France,**

Immeuble OPUS 12, 77 Esplanade du général de Gaulle, CS 90047, F- 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Tel: 01 55 69 96 00

OPMERKING

Lees het hele etiket vóór u dit product gebruikt

PFC 1(C)(II)(a) Enkelvoudige minerale micronutriëntenmeststof
Solution liquide

Inhoud % massa:

3,9% IJzer (Fe) (= 54 g/l) oplosbaar in water
3,9% gechelateerd ijzer, 1,5% gechelateerd met o,o EDDHA

o-o gechelateerde fractie stabiel tussen pH 4 en pH 10

Ingrediënten > 5% (w/w): IJzer EDDHA CAS n° 16455-61-1 (CMC 1: stoffen en mengsels als primair materiaal), monoethyleenglycol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Partijnummer/ Fabricagedatum: Zie verpakking

Geïmporteerd door/ Importé par **Yara Vlaardingen B.V.**
Zevenmanshaven Oost 67, 3133 CA Vlaardingen, Postbus 58, 3130 AB Vlaardingen. Tel: +31 10 445 2000

Distributie/Distribution: **Yara Tertre S.A./N.V.** Rue de la Carbo 10, B-7333 Saint-Ghislain, Belgium. Tel: + 32 6571 2448

Gemaakt door/Produit par: **Yara UK Ltd.,** Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: +44 1759 302545

10 liter/ litres
Netto gewicht
Masse nette
13,85 kg

YaraVita™ Ferritrac 54

DOSES D'APPLICATION

Doses par hectare : Chlorose faible: 25 l/ha, Chlorose moyenne: 40 l/ha, Chlorose sévère: 55 l/ha. Sur sols perméables il est recommandé de diviser les doses indiquées en 3 à 4 applications au cours de la saison.

Traitement de sujets isolés : Les doses d'application suivantes sont exprimées en ml/plante (arbre ou cep) sur la base de pépinières, nouvelle plantation, début production et pleine production respectivement:

Vignes: Se référer à la dose hectare; 5 ml; 5 ml; 5-10 ml.

Fruits à pépins: 5 ml; 5-15 ml; 20-30 ml; 35-120 ml.

Fruits à noyau: 5 ml; 5-15 ml; 20-40 ml; 55-175 ml.

Cultures maraichères, plantes ornementales: Appliquer 4 à 6 ml/m².

Irrigation fertilisante (goutte à goutte et microjets)

0,4-0,6 l/1.000 m² à répéter à 7-10 jours d'intervalle selon les besoins. Possibilité d'augmenter les doses à 0,8-1,2 l/1.000 m²/apport pour l'arboriculture (prévoir 3 à 4 apports sur la saison selon l'intensité de la chlorose).

STADES D'APPLICATION

Traitement préventif : Il faut positionner le produit le plus près possible de la zone d'absorption des racines avant la reprise de la végétation au printemps ou avant plantation.

Traitement curatif : Appliquer dès les premiers symptômes de chlorose.

En cas d'application en surface, une façon culturale superficielle permet d'éviter la dégradation à la lumière. De plus, pour faciliter la migration du produit jusqu'aux racines, irriguer abondamment s'il ne pleut pas. Traiter de préférence sur sol frais et humide pour assurer une meilleure absorption racinaire.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Après avoir bien agiter le bidon, verser le produit très progressivement à travers un filtre, la cuve remplie au trois-quarts d'eau, tout en veillant à assurer un débit d'eau suffisant. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGES EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou demandez à votre conseiller de consulter les informations contenues sur notre site www.tankmix.com. Pour des conseils plus spécifiques, vous pouvez également contacter directement un représentant Yara.

PRÉCAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées (serres, abris plastiques) et si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Évitez l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie ou lorsque

ces conditions sont anticipées. Portez des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation. Veuillez consulter la fiche de donnée de sécurité pour plus d'informations, disponible sur www.yara.com.

STOCKAGE

A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. Protéger des températures extrêmes (-5°C et +35°C). Éliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

CONDITIONS DE VENTE

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions de vente.

DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP

Voor goede werking dient het product aanwezig te zijn in de wortelzone. Voor fruitteelt is dit tijdens het barsten van de knoppen. Tijdstop van toepassing is daardoor afhankelijk van de toedieningsmethode. Bij curatieve toepassing toepassen zodra gebreksymptomen verschijnen.

Bodemtoepassing: Geschikt voor volveldstoepassing, via fertigatie of met onkruidspuit. Omdat ijzerchelaat afbreekt onder invloed van zonlicht Ferritrac 54 inrengen of toepassen tijdens een regenbui. Bij fertigatie wekelijks doseren in porties van 3-4 l/ha.

Toepassing en dosering.

Aardbeien: 10-15 l/ha voor het planten of via fertigatie.

Bloembollen: 10-15 l/ha voor het planten of bodemtoepassing voordat het gewas 15cm hoog is.

Boomkwekerij: 2-5 ml/m²

Fruitteelt: Toepassen op de zwartstrook voor de start van het groeiseizoen (kort voor de bloei) of in de periode dat de wortels het meest actief zijn (augustus).

Licht gebrek: 10 l/ha.

Matig gebrek: 20 l/ha.

Ernstig gebrek: 40 l/ha.

GEBRUIKSAANWIJZING

BEREIDING EN TOEPASSING VAN DE SPRAYOPLOSSING

Voor het gebruik goed schudden. Het product toevoegen als de tank voor 3/4 gevuld is met water, terwijl de roerrichting in werking is. Vul de tank verder en blijf roeren tot het product verspoen is.

TANK MIX / GECOMBINEERDE TOEPASSING

Lees ALLE etiketten zorgvuldig en volg de instructies voor het gebruik strikt op. Het combineren met andere producten is geheel voor risico van de eindgebruiker. Bezoek www.tankmix.com voor belangrijke informatie. U kunt ook contact opnemen met Yara voor specifiek advies.

WAARSCHUWINGEN

Dit product alleen gebruiken op teelten onder bescherming (glas, plastic) wanneer deze specifiek worden genoemd. Het product niet gebruiken onder extreme weersomstandigheden, zoals sneldrogende weersomstandigheden, zeer langzaam-drogende omstandigheden, vorst, regen of wanneer vorst of regen wordt verwacht. Draag passende handschoenen en gezichtsbescherming

YaraVita™ Ferritrac 54

wanneer u met dit product werkt. Reinig de gehele uitrusting zowel vóór als na gebruik. Raadpleeg de MSDS voor meer informatie, beschikbaar op www.yara.com.

OPSLAG

Bewaren in een koele, droge opslagplaats, geschikt voor chemicaliën. Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren. Beschermen tegen vorst en andere extreme weersomstandigheden ($-5^{\circ}\text{C} < \text{en} < 35^{\circ}\text{C}$). Voer de verpakking af in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

VERKOOPVOORWAARDEN

Dit product wordt verkocht behoudens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper. Deze zijn beschikbaar op aanvraag. Gebruik van het product betekent het aanvaarden van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper.



UFI: Q8G0-20WV-D00V-RKMM

Attention

Ingrédients dangereux: éthylène-glycol.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

P260-a: Ne pas respirer les poussières. P314-a: Consulter un médecin en cas de malaise.

Waarschuwing

Gevaarlijke bestanddelen: 1,2-ethaandiol

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

P260-a: Stof niet inademen. P314-a: Raadpleeg een arts indien u zich onwel voelt.