



YaraVita™ Zintrac™ 700



5L

Neto težina:
Nettó tőmeg:
Greutate netă:
8,67 kg

Zintrac™ 700

HR UPOZORENJE

Prije korištenja proizvoda obavezno pročitati uputu za upotrebu.

**PFC 1(C)(II)(a) Jednostavna anorganska gnojiva s mikrohranljivima
Tkuću suspenzija**

Sadržaj % po masi:

40,9% (= 709 g/l) cink (Zn) kao oksid, ukupno

Također sadrži % w/w:

1% (= 17 g/l) ukupno dušika (N) [1% dušika uree]

Sastojci: Cinkov oksid CAS n° 1314-13-2 (CMC 1: Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina), monoetilen glikol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Koristite samo tamo gdje je naznačeno. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu. Ovo gnojivo sadrži ureu, koja može otpustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima, moraju se poduzeti odgovarajuće mjerje sanacije.

Serijski broj/ Datum izrade: Pogledajte na pakiranju

Rok trajanja: 3 godina od datuma proizvodnje

HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

**PFC 1(C)(II)(a) Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya
Folyékony szuszpenzió**

Tartalom tömegszázalék:

40% (= 709 g/l) cink (Zn) mint oxid, összesen

Tartalom tömegszázalék:

1% (= 17 g/l) teljes nitrogén (N) [1% karbamid-nitrogén]

Összetevők: Cink-oxid CAS n° 1314-13-2 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), monoetilénglikol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

Csak indokolt esetben használendő. Ne lépje túl a javasolt adagolást! Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedésekkel kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

YaraVita™ Zintrac™ 700

RO ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

PFC 1(C)(II)(a) Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelement
Suspensie lichidă

Conținut % din masă:

40% (= 709 g/l) zinc (Zn) ca oxid, total

Conține, de asemenea, % g/g:

1% (= 17 g/l) azot (N) total [1% azot ureic]

Compoziție: Oxid de zinc CAS n° 1314-13-2 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), monoetenil glicol CAS n° 107-21-1 (CMC 1).

A se utiliza doar unde este indicat. Nu depășiți doza recomandată. Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numărul lotului: vezi pe bidon

Data fabricației: vezi pe bidon

Importat de: **Yara Poland Sp. Z.o.o**, Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, Polonia, tel. +48 91 4330 035. Contact local verificați www.yara.ro

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary.
Tel: +36 88 577 940

Proizvodi/Által termelt/ Proizveo: **Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK. Tel: 01759 302545



YaraVita Zintrac™ 700



BG

Внимание

H410: Сильно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

P391: Съберете разлялото.

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/ съобразено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.

Вносител:

КВС Агро България ООД , София, ул. Ами Буе 39, тел. 02/9546002

HR

Upozorenje

H410: Vrlo otrovno za vodení okoliš, s dugotrajním učincima.

P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P391: Sakupiti proliveno/rasuto.

P501: Ukloniti sadržaj i spremnike u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim zakonima.

Distributeri za Hrvatsku:

Cipro d.o.o. Lepajci 4a, 49 000 Krapina,
Tel: 049/382 000 www.cipro.hr

Colic trade d.o.o., 23210 Biograd n/m, Radovanova 12,
Tel: 023 662 109 www.colic.hr

HU

Figyelem

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

Forgalmazó:

Yara Hungária Kft,
8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Magyarország
Tel: +36 88 577 940

RO

Atenție

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

P391: Colectați surgerile de produs.

P501: Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Furnizor:

Yara Hungária Kft,
8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Hungary
Tel: +36 88 577 940

ДОЗИ И МОМЕНТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ-ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

PRIMJENA/DOZE PRIMJENE

A FELHASZNÁLÁS IDŐZITÉSE ÉS GYAKORISÁGA

DOZE SI MOMENT DE APPLICARE

YaraVita Zintrac™ 700

Ябълки, Круши: Доза - 100 мл/дка. Пролет: Фаза набъбване на пъпките. Фаза веднага след края на цъфтежа. Не пръскайте по време на цъфтеж! Лято/есен: Фаза след прибиране на плодовете преди листопад. Количеството на водата за пръскане – 50 л/дка.

патлажан полско производство: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни. Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Фасул: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Пшеница, ечемик, ръж, тритикале, сорго и овес: Доза - 100 мл/дка. Фаза от 2-ри лист до 1 междувъзлие. При нужда може да бъде повторено след 14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 5-20 л/дка.

Череши, Сливи: Доза - 100 мл/дка. Фаза зимни пъпки. Фаза Розови пъпки. Не пръскайте по време на цъфтеж! Фаза след прибиране на плодовете преди листопад.

Количеството на водата за пръскане – 50 л/дка.

Краставици дългоподлоди полско производство: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза 10-14 дни след поникване/разсаждане до начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Лозя: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза при наличие на достатъчно листна маса пред пролепта преди цъфтеж. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20-50 л/дка.

Царевица: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза 3-8 листа или 2-4 двойки листа. При нужда може да бъде повторено след 14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

пипер полско производство: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Картофи: Доза - 100 мл/дка. Фаза една седмица след 100% поникване. При нужда може да бъде повторено след 14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Малини: Доза - 50 мл/дка. Фаза зелена пъпка.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Салатно цвекло: Доза - 100 мл/дка. Фаза 4-6 лист.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Соя: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Ягоди полско производство: Доза - 50 мл/дка. Фаза зелена или бяла пъпка. Фаза след прибиране на реколтата и възстановяване на растежа. Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Захарно цвекло: Доза - 100 мл/дка. Може да се повтори след 10-14 дни. Фаза 4-6 лист.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Сланчоглед: Доза - 100 мл/дка. Фаза 4-8 лист.

Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

Домати полско производство: Доза - 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни. Количеството на водата за пръскане – 20 л/дка.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЕТИКЕТА.

Преди употреба стартирайте разплъзнатите опаковката.

Изиспите продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с необходимото количество вода, при включено разбръкане. Дополейте останалата вода и продължете да разбръквате до пълното изпърскване на разтвора.

СМЕСИМОСТ

Прочетете внимателно етикета и се придържайте стриктно към инструкциите за употреба и съветите относно това дали продукта/ите да се смесва или не. Много променливи фактори, извън контрола на Яра могат да повлияват при прилагането на резервоарни смеси и поради тази причина, такова приложение е използвано отговорност на крайния потребител. Препоръчва се преди употребата на резервоарна смес да се направи предварителен тест за съвместимост, на ограничена площ. Преди употреба на резервоарни смеси вие или вашият съветник трябва да посети www.tankmix.com за важна информация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да се използва само при културите, които са описани. Да се избягва приложение при екстремни климатични условия като силно засушаване, преовлажняване, замръзване, обилини дъждове или когато такива се очакват. Да се носят подходящи предпазни ръкавици и средства за предизваждане на очите/лицето по време на работа с продукта. Цялото оборудване да се почиства преди и след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в сухи и хладни помещения далеч от достъп на деца и животни. Да се предпазва от замръзване и други екстремни климатични условия (температури над 40°C).

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА – ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

Яра гарантира, че продукта в неразплечнатата опаковка отговаря на химическото описание от етикета. Указанията от етикета са базирани на тестове, считани за надеждни, и трябва да бъдат стриктно следвани. Поради вероятността от наличие на необичайни климатични и почвени условия и употреби на този продукт, които са извън контрола на Яра, не се дава гаранция, изразена или подразбираща се по отношение на ефекта от такава употреба или получените резултати и в никой случай отговорността на Яра не превишава стойността на използвания продукт. Ползвателят трябва да поеме всички рискове, произлизащи от съхранението, работата и приложението на този продукт. Използването на продукта предполага, че купувача приема тези условия на продажба.

YaraVita Zintrac™ 700

Breskva, Marelica: 1 do 2 l/ha kod zimskog pupa, i ponovo u fazi ružičastog pupa. Također, 0,5 l/ha nakon zametanja plodova i ponavljanje prema potrebi u intervalima od 14 do 21 dan sve do mjesec dana prije berbe. 1 do 2 l/ha nakon žetve, ali prije opadanja listova.

Količina vode: 200 do 1000 l/ha

Jabuka, Kruška: 1 do 2 l/ha kod pupanja, i na kraju cvatnje. Izbjegavajte korištenje tijekom cvatnje. Također, 0,5 l/ha šest tjedana nakon zametanja plodova i ponavljanje prema potrebi u intervalima od 14 do 21 dan sve do mjesec dana prije berbe. 1 do 2 l/ha nakon žetve, ali prije opadanja listova. Količina vode: 200 do 1000 l/ha

Kukuruz: 0,3 do 1 l/ha u fazi 3 do 8 listova. Kod ozbiljnog nedostatka potrebno je ponoviti primjenu u istoj dozi u intervalima od 10 do 14 dana.

Količina vode: 30 do 200 l/ha

Rajčica: uzgoj na otvorenom: 0,3 do 1 l/ha u fazi 4 do 6 listova. Ponoviti u interval od 10 do 14 dana ako je potrebno. Količina vode: 30 do 500 l/ha.

Šljiva: 1 do 2 l/ha u fazi zimskog pupa I u fazi ružičastog pupa. Također, 0,5 l/ha od stvaranja plodova u intervalima 2 do 3 tjedna sve do mjesec dana prije berbe. Nakon berbe a prije opadanja listova primjeniti 1 do 2 l/ha.

Količina vode: 200 do 1000 l/ha.

Suncokret: 0,5 do 1 l/ha od faze 2 para listova.

Količina vode : 50 do 200 l/ha.

Trešnja, višnja: 1 do 2 l/ha u fazi zimskog pupa i ponovo u fazi bijelog pupa. Također, 0,5 l/ha od stvaranja plodova u intervalima 2-3 tjedna sve do mjesec dana prije berbe. Nakon berbe a prije opadanja listova primjeniti 1-2 l/ha.

Količina vode: 200 do 1000 litara.

Uljana repica: 1 do 2 l/ha u fazi 4 do 9 listova.

Količina vode: 30 do 500 l/ha.

Žitarice: 0,5 do 1 l/ha od stadija 2 lista do pojave prvog nodija (Zadok's G.S 12 do 31), ponaviti jednom ili dvaput u intervalima od 10 do 14 dana u slučajevima umjerenog do teškog nedostatka. Također, 0,5 l/ha od potpune pojave klase do kraja cvatnje (Zadok's G.S. od 59 do 69).

Količina vode: 50 do 200 l/ha.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uvijek sljedite ove upute naznačene na etiketi

Prije uporabe temeljito promiješajte proizvod. Polaganje dodajte proizvod u spremnik, preko induktivskog ljevka, uz stalno miješanje. Nadopuniti spremnik vodom i nastavite s miješanjem sve dok ne završite sa prskanjem.

TANK MIX KOMPATIBILNOST (MIJEŠANJE)

Strogo se pridržavati uputa za uporabu i savjeta. Primjena u kombinacijama s drugim proizvodima u potpunosti je na rizik krajnjeg korisnika, jer je mnogo uzroka izvan kontrole Yare. Prije miješanja proizvoda pregledajte www.tankmix.com za važne informacije. Alternativno kontaktirajte Yaru za specifične savjete.

UPOZORENJA

Koristiti u zaštićenim prostorima samo ako je navedeno. Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu,mrazu,kiši. Proizvođač jamči za kvalitetu sredstva ukoliko je u originalnom pakiranju ne odgovara za eventualno nastalu štetu ili slabije djelovanje uslijed nestručne upotrebe i/ili nepravilnog skladišnja.

Koristiti sredstva osobne zaštite (zaštitne rukavice i štitnik za lice) prilikom upotrebe ovog proizvoda. Očistiti uređaje za primjenu prije i poslije upotrebe.

SKLADIŠTENJE

U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, zaštićeno od ekstremnih temperaturnih uvjeta (smrzavanja i temperature iznad 40°C), izvan dohvata djece i izvan dohvata životinja. Odstraniti sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

UVJETI PRODAJE

Ograničeno jamstvo i ograničenje odgovornosti Yara jamči da proizvod u zatvorenoj ambalaži odgovara kemijskom opisu na ovoj etiketi. Pridržavajte se uputa na etiketi koje se temelje na ispitivanjima i smatra se da su pouzdane. Kako su pojave neuobičajenih vremenskih uvjeta ili uvjeta tla, kao i korištenje ovog proizvoda, izvan kontrole Yare ne postoji jamstvo,ičrtoći ili podrazumijevano, za učinke uporabe ili rezultate i ni u kojem slučaju odgovornost Yare ne prelazi cijenu proizvoda koji se koristi. Kupac mora preuzeti rizike skladištenja,uporabe i primjene proizvoda. Korištenje proizvoda podrazumijeva da kupac prihvata ove uvjete prodaje.



YaraVita Zintrac™ 700

Almafélék: 0,5-1 l/ha dőzisban rügypattanáskor és virágzás végén. Szükség esetén 0,5 l/ha dőzisban 6 héttel a terméskötödés után, majd 14-21 naponként, egy hónappal a betakarítás előtt befejezve. Perzelésre érzékeny fajtákknál a kezelést a virágzás után hat héttel kell kezdeni. További kezelés végezhető 1-2 l/ha adagban betakarítás után de még lombhullás előtt .
Vízmennyiségek: 400-1000 l/ha

Burgonya: 1,0 l/ha a teljes kihajtás után egy héttel.
Hiánytűnet esetén a kezelés 10-14 naponként ismételhető.

Vízmennyiségek: 300-500 l/ha

Cseresznye: 1-2 l/ha adagban kijuttatva téli rügy (BBCH51)

vagy fehérbimbós (BBCH57) állapotban. Kötődéstől 2-3 hetenként ismételve. Utolsó kezelést legkésőbb szüret előtt 1 hónappal befejezni. További kezelés végezhető 1-2/ha adagban a szüret után, de még a lombhullás előtt. Vízmennyiség: 500-1000l/ha

Gabonafélék: 0,5-1 l/ha dózisban két leveles állapottól az első nódus megjelenéséig (Zadok 12-31 fenofázis)

Közepes vagy erős hiány esetén a kezelést 10-14 nap múlva ismételik meg. Vízmennyiség: 200-400 l/ha.

Görögdinnye (szabadföldi termesztés): 0,5 l/ha. Három kozeléktől származó alkalmazói: 15, 20 és 45 naposan csírázás.

Keketést célszerű alkalmazni: 15, 30 és 45 nappal csírázás után. Vízmennyiség: 400 l/ha.
Kukorica: 0,5-1 l/ha dózisban 3-8 leveles stádiumtól. Hiánytűnökkel jelentkezés esetén 10-14 nap múlva

Műanyagcserek jelenlétében esetén 10-14 nap móda
ismétlőjük meg a kezelést. Vízmennyiség: 200-400 l/ha.
Ősz káposztarepce: 1-2 l/ha 4-9 leveles állapotban.
Vízmennyiség: 50-500 l/ha.

Napraforgó: 0,5-1 l/ha 4 leveles állapotban.

Vízmennyisésg: 50–100 l/ha.
Paprika (szabadtöldi): 1 l/ha mennyisésgben juttassuk ki, 4-6 leveles állapotban. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést. Figyelem! Az utolsó kezelés minimum egy hónappal a betakarás előtt történjen meg!
Vízmennyisésg: 500 l/ha

Szabadföldi paradicsom: 0,3-1 l/ha 4-6 leveles állapotban, 10-14 naponta ismétljük meg a kezelést, amennyiben a hiánytűnetek még mindig megfigyelhetőek. Vízmennyiség: 70-500 l/ha.

Szója: 1 l/ha a növény 5-15 cm-es állapotában, (VI). Ha szükséges, 10-14 naponta ismételjük meg a kezelést, egészen a virágzást megelőző pillanatig, (VI).
Vízmennyiségek: 30-200 l/ha

Szőlő: 0,4-1 l/ha adagban a hajtásnövekedés időszakában, a virágzás előtt. Ha szükséges a kötődés idején a kezelést meg lehet ismételni. 1 l/ha adagban a betakarítás után, a levelek megrögegedése előtt.

Pentelle mennyisége: 400 l/ha

Használati utasítás

Mindig kövesse a címke utasításait

Mindig kövessé a címke átadásait
Felhasználás előtt alaposan férőzandó

Töltse fel a permetezőgép tartályt hármonnagyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosott tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

Keverhetőség/együttes alkalmazás

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja.

Kockázatait teljes mértékben a Végzettszínű vállalja.
Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy
szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot.

Szaktanácsadója feléssze le a www.tanitmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

Figyelmeztetés

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméköt extrém időjárási viszonyok között, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, tavabbá fagy és eső esetén, vagy ha az előrejelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt és után tisztítsjon meg minden eszközöt.

Tárolás

Tárolja hűvös száraz növényvédőszer raktárban

Gyermekekktől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagyott és szűsöséges időjárási körülményektől (40°C feletti hőmérséklettől) Tartsa be a kürült csomagolásanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat

Értékesítési feltételek

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata feltétellezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

YaraVita Zintrac™ 700

Căpșuni (cultivate pe câmp): 0.5 l/ha începând cu faza de buton verde, urmat de 2 aplicări a 0.25l/ha aplicate la faza de fruct alb și după recoltare.

Doza de apă: 200-500 l/ha.

Cartofi: o aplicare de 1 l/ha la o săptămână după apariția 100% a creșterilor vegetative(frunze). O a doua aplicare poate fi făcută după 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.
Ceapă: 1 l/ha când frunzele sunt suficiente de dezvoltate pentru a intercepta soluția. Doza de apă 200 l/ha.

Cereale: 1l/ha începând cu a 2 frunză până la apariția celui de al doilea nod (G.S. 12 – 32). De asemenea se aplică doza de 0.5l/ha și în stadiul de (G.S.59-69) la apariția spicului până la sfârșitul înfloririi. Doza de apă 50 - 200l/ha. Se poate utiliza și la tratamentul semințelor la o doză de 3-8 litri/tonă.

Cires, Prun: 1 – 2 l/ha la faza de formarea mugurilor la deziernat și din nou la faza de buton roz. Se poate aplica și după recoltare înainte de cădere frunzelor.
 Doza de apă: 500-1000 l/ha.

Conifere: 1 l/ha în două aplicări, una la apariția frunzelor noi și una devreme în toamnă.
 Doza de apă: 500-1000 l/ha.

Fasole: 0.5 - 1 l/ha la faza de 5 – 15cm înălțime.

Doza de apă: 200 l/ha.

Gazon: 1 l/ha primăvara devreme când începe creșterea, sau la identificarea deficiențelor. Doza de apă: 200 l/ha
Mazăre: 0.5 - 1 l/ha la faza de 5 – 15cm înălțime.
 Doza de apă: 200 l/ha.

Morcov: 1 l/ha la faza de 15 cm sau când frunzele sunt suficiente de dezvoltate pentru a intercepta soluția. Pentru deficiență moderată până la severă se poate repeta la interval de 10-14 zile. Doza de apă: 200 l/ha.

Nectarin: 0,5 l/ha. Aplicarea după recoltare, dar înainte de cădere frunzelor. Doza de apă: 200-1000 l/ha.

Porumb: 0,3 -1 l/ha în stadiul de 3-8 frunze. Pentru deficiență severă se poate repeta tratamentul la un interval de 10-14 zile. Doza de apă 200 l/ha. Alternativ 1,5 l/ha aplicat la 20 zile după semănat și încă odată la 40 zile după semănat. Doza de apă 200-400 litri. Aplicare la sol 3-5 l/ ha. Tratament sămănătă 2-8 litri/tonă.

Sfeclă roșie, Sfeclă de zahăr: 1 l/ha la etapa 4-6 frunze. Pentru deficiențe moderate până la severe, ar trebui să se repete doza de mai sus la intervale de 10-14 zile.

Doza de apă: 200 l/ha.

Soia: 0.5 - 1 l/ha la faza de 5 – 15cm înălțime.

Doza de apă: 200 l/ha.

CULTURI PROTEJATE

0,05 litri la 100 litri de apă concentrație maximă. Doza de apă: 1000 l/ha maxim. Consultați cultura echivalentă cultivată în câmp pentru momnetul aplicării.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agiatați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu.

Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citii cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicarea combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, îngheț, ploaie, sau când sunt previzionări de îngheț și ploaie. Purtăți mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea vietuitoarelor. A se proteje de îngheț și alte extreme climatice (temperaturi peste 40° C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.