



YaraVita™
Last N™

ATENȚIE

Înainte de a utiliza acest produs, citește întreaga etichetă.

Last N™

PFC 1(C)(I)(b)(i) Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement N 26

Soluție lichidă

Conținut % din masă:

25% (= 312 g/l) azot (N) total

[3,9% (= 49 g/l) azot amoniacal, 3,9% (= 49 g/l) azot nitric,
11,8% (= 147 g/l) azot ureic, 5,4% (= 67 g/l) azot uree formaldehidă]

Compoziție: Uree CAS n° 57-13-6 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine), nitrat de amoniu CAS n° 6484-52-2 (CMC 1) metilen uree CAS n° 9011-05-6 (CMC 1)

Acest îngrășământ conține uree, care poate elibera amoniac și poate avea un impact asupra calității aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Numărul lotului/ Data fabricației: vezi pe bidon.

Expiră la: 5 ani de la data fabricației.

Importat de: **Yara Poland Sp. z o.o.** ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Tel. (091) 433 00 35

Agent autorizat: **Summit Agro Romania SRL**. Str. Dr. Iacob Felix no.87,
sector 1, Bucuresti. Tel: (021)-223.14.47.

Furnizor: **Yara UK Ltd.**, Manor Place, Pocklington, York, YO42 1DN, UK.
Tel: (+44) 1759 302545

UFI: RHGO-M002-A00C-QMCT

Atenție

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P264: Spălați-vă bine mâinile după manipulare.

P305+P351+P338+P337+P313:
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.



20 litri
Greutate neta
25 kg

YaraVita™ Last N™

DOZE SI MOMENT DE APLICARE

Ardei (De Grădină): 10 până la 15 l/ha. Se aplică în stadiul de formare a fructului și se repetă după 10-14 zile dacă este necesar. Volumul de apă: minim 500 l/ha.

Castraveti (De Grădină): 10 până la 15 l/ha. Se aplică în stadiul de 4-6 frunze. Dacă este necesar se repetă după 10-14 zile. Volumul de apă: minim 500 l/ha.

Cereale: 11 până la 22 l/ha. Se aplică de la înfrățire până la ieșirea din burduf (Zadoks G.S. 21 la 59). Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha. N.B. Aplicarea târzie a îngrășământului foliar pe bază de azot poate crește procentul de azot conținut în bob.

Dovlecei (De Grădină): 10 până la 15 l/ha. Se aplică la formarea fructului și se repetă după 10-14 zile dacă este necesar. Volumul de apă: minim 500 l/ha.

Fasole, Mazăre: 10 până la 15 l/ha. Se aplică înainte de înflorire. Se repetă la formarea păstăii dacă este necesar. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

Floarea Soarelui: 10 până la 15 l/ha. Se aplică în stadiul de 4-6 frunze. Dacă este necesar se repetă după 10-14 zile. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

Lucernă: 10 până la 15 l/ha. Se aplică după fiecare cosire când există suficientă vegetație. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

Orez: 10 până la 25 l/ha. Se aplică în stadiul de 2-3 frunze și/sau de apariție a frunzei standard. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

Pepene, Pepene Verde (De Grădină): 10 până la 15 l/ha. Se aplică în stadiul 4-6 frunze. Dacă este necesar se repetă după 10-14 zile. Volumul de apă: minim 500 l/ha.

Porumb: 11 până la 22 l/ha. Se aplică la stadiul de 4-6 frunze și se repetă după 10-14 zile. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

Salată Verde (De Grădină): 10 până la 15 l/ha. Aplicați după 10-14 zile de la răsărire sau transplantare. Repetați după 14 zile și apoi din nou cu 14 zile înainte de recoltare. Volumul de apă: minim 500 l/ha.

Sorg: 10 până la 15 l/ha. Se aplică în stadiul de 4-6 frunze și se repetă după 10-14 zile. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

Soia: 10 până la 15 l/ha. Se aplică în stadiul pre-floral. Dacă este necesar se repetă la formarea păstăii. Volumul de apă: 100 la 200 l/ha.

Spanac: 10 la 15 l/ha. Se aplică când există suficiente frunze și se repetă după 14-21 zile dacă este necesar. Volumul de apă: minim 500 l/ha.

Varză: 10 până la 15 l/ha. Se aplică după 10-14 zile de la răsărire sau transplantare. Dacă este nevoie se repetă la formarea timpurie a căpățanii și la intervale de 10-14 zile. Volumul de apă: 100 până la 200 l/ha.

FERTIRIGARE

10 până la 15 l/ha. Se aplică singur. Amestecați și folosiți imediat. Spălați instalația imediat după folosire cu multă apă. A NU se folosi în instalații închise sau recirculante și nici la plante/culturi cultivate în ghivece/recipiente. Se repetă în aceeași doză, același număr de aplicații și perioadă, ca pentru recomandările de la îngrășămintele foliare pentru fiecare cultură. Aplicarea prin fertirigare se face individual și NU îmbinat cu aplicările foliare recomandate pentru acest produs.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNȚOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE PE ETICHETĂ

Agitați bine produsul înainte de utilizare. Adăugați produsul încet în rezervor, prin filtrul superior, agitând continuu. Completați cu apă și continuați să agitați până la terminarea stropirii.

COMPATIBILITATE/APLICARE MIXTĂ

Citiți cu atenție toate etichetele și respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare. Aplicarea combinată este întotdeauna în răspunderea utilizatorului final. Înainte de aplicare combinată a produselor, dumneavoastră sau consilierul dumneavoastră trebuie să vizitați pagina de Internet www.tankmix.com pentru informații importante. Alternativ, puteți să contactați firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUȚII

Utilizare doar pentru protejarea plantelor menționate în listă. A se evita aplicarea în condiții climatice extreme cum ar fi evaporare rapidă, evaporare foarte înaltă, îngheț, ploaie, sau când sunt prevăzionate de îngheț și ploaie. Purtați mănuși și mască de protecție a feței când folosiți produsul. Spălați tot echipamentul înainte și după folosire. Vă rugăm să consultați Листа за безопасност pentru informații suplimentare, disponibil la www.yara.com.

DEPOZITARE

A se păstra la loc răcoros, în depozit uscat de produse chimice, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și în apropierea viețuitoarelor. A se proteja de îngheț și alte extreme climatice (<-5°C și <35°C). Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

CONDIȚII DE COMERCIALIZARE

Acest produs este vândut în conformitate cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, care sunt disponibile la cerere. Utilizarea Produsului reprezintă acceptarea de către cumpărător a Termenilor și Condițiilor de Vânzare.





YaraVita™

Last N™

NAPOMENA

Pre upotrebe ovog proizvoda pročitati etiketu.

Za profesionalne proizvođače dostupni su, na zahtev, sigurnosni podaci o proizvodu.

Last N™

EC ĐUBRIVO

Azotno đubrivo

Garantovano analizom:

25% = 312 gr/l azota (N) ukupno

(3,9% = 49 g/l nitratni azot, 3,9% = 49 g/l amonijačni azot,

11,8% = 147 g/l ureični azot)

Broj rešenja i nadležni organ: 321-01-00250/2019-11 od 4.3.2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja.

Proizvodi:

Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN,

UK. Tel: 01759 302545

Distribuiru:

Agrimatco doo. Narodnog Fronta 73/1,

21000 Novi Sad

Tel: 021/469-629 Fax: 021/469-580



Upozorenje

H319: Dovodi do jake iritacije oka.

P280: Nositi zaštitne naočare.

P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

P305+P351+P338: AKO DOSPE U

OČI: Pažljivo ispirati vodom

nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna

sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je

to moguće učiniti. Nastaviti sa

ispiranjem.

P337+P313: Ako iritacija oka ne

prolazi: potražiti medicinski savet/

mišljenje.



20 litara

Neto težina

25 kg

YaraVita™ Last-N™

VREME I NAČIN PRIMENE

Jabuke, Kruške: 5-10 l/ha u fazi kretanja pupoljaka do početka cvetanja, ili 10-14 dana posle opadanja latica. Po potrebi ponoviti tretman za 10-14 dana. Količina vode: 500 l/ha.

Passulj, Grašak : 10-15 l/ha pre početka cvetanja. Po potrebi ponoviti tretman 10-14 dana kasnije. Količina vode: 200 l/ha

Brokoli, Prokelj, Kupus, Karfiol: 10-15 l/ha. Prvi tretman se primenjuje 10-14 dana posle rasadivanja. Po potrebi tretman se može ponoviti u intervalima od 10-14 dana. Količina vode: 200 l/ha

Luk: 10-20 l/ha. Tretman treba početi kada su biljke visine 15-20 cm, po potrebi ponoviti tretman 3-4 puta u intervalima od 7-10 dana. Količina vode: 200 l/ha

Krompir: 10-20 l/ha. Preporučuje se upotreba pre formiranja krtola i na početku cvetanja. Količina vode: 100-200 l/ha

Jagode (na otvorenom): 5-10 l/ha pre početka cvetanja i po potrebi ponoviti tretman posle zamećanja polodova. Količina vode: 500 l/ha.

Uljana repica: 10-20 l/ha prva primena u fazi 4-8 listova. Druga primena 10-20 l/ha u fazi porasta cvetonosnih grana. Po potrebi tretman se može ponoviti u intervalima od 10-14 dana. Količina vode: 200 l/ha.

Strna žita: 11-22 l/ha od početka bokorenja do faze mlečne zrelosti. Po potrebi tretman se može ponoviti u intervalu od 10-14 dana. Količina vode : 200 l/ha

Kukuruz: 10-20 l/ha u fazi 4-6 listova. Po potrebi ponoviti tretma još jednom u intervalu od 10-14 dana. Količina vode: 200 l/ha

Šećerna repa: 10-25 l/ha u fazi 4-6 listova. Po potrebi ponoviti tretma još jednom. Količina vode: 100-200 l/ha.

Zaštićeni prostor: maksimalna koncentracija je 0,5 lit na 100 lit vode. U skladu sa zahtevima i vremenima primene za konkretan usev. Količina vode: 1000 l/ha maksimalno.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UVEK PRATITI INSTRUKCIJE SA ETIKETE

Proizvod temeljno premešati pre upotrebe. Sipati kroz filter u rezervoar koji je do dve trećine napunjen sa vodom, uz uključeni mešać. Dopuniti vodom i nastaviti sa mešanjem dok se prskanje ne završi.

MEŠANJE I PRIMENA

Pročitati pažljivo sve etikete, strogo se pridržavati propisanih načina upotrebe i saveta koji se odnose na mogućnost zajedničke primene sa drugim preparatima. Razni, promenljivi faktori, koji nisu pod kontrolom Yare, mogu predstavljati direktan uticaj na učinak zajedničke primene sa drugim preparatima, stoga celokupan rizik svakog mešanja i zajedničkog primenijavanja sa drugim preparatima snosi krajnji korisnik. Striktno se preporučuje da se uradi ograničena aplikacija, odnosno primena, u slučaju da se koriste mešavine sa nepoznatim proizvodima po prvi put. Pre bilo kakve zajedničke upotrebe i mešanja sa drugim preparatima, vi, ili vaš savetnik morate posetiti sajt www.tan-kmix.com radi provere važnih informacija vezanih za mešanje proizvoda. Kao alternativa, uvek možete kontaktirati Yaru radi dobijanja konkretnih saveta.

PREDOSTROŽNOSTI

Isljučivo primenjivati na zaštićenim usevima ako je to konkretno napomenuto. Izbegavati upotrebu pod ekstremnim klimatskim uslovima, na primer u uslovima brzog sušenja, ekstremno sporim uslovima sušenja, mraza, kiše ili ukoliko se očekuju mraz ili kiša. Nositi zaštitne rukavice i maske za lice pri rukovanju sa ovim proizvodom. Oprati svu opremu pre i posle upotrebe.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu specijalizovanom za skladištenje hemije, van domašaja dece i domaćih životinja. Zaštititi od smrzavanja i ostalih vremenskih uslova (kad temperatura prelazi 40°C).

USLOVI PRODAJE - GARANCIJSKA OGRANIČENJA I USLOVI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Yara garantuje da proizvod koji se nalazi u neotvorenom kantištu odgovara po hemijskom sastavu onome što je navedeno na etiketi. Uputstva na ovoj etiketi se zasnivaju na testovima za koje se smatra da su pouzdani i ista se moraju pažljivo pratiti. Upotreba ovog proizvoda pri pojavi neobičnih vremenskih, kao i zemljišnih uslova je van nadležnost i kontrole Yare, u tom slučaju nema garancije, izražene, ili implicirane za rezultat dobijen kao posledice takvog korišćenja, a ni u kom slučaju odgovornost Yare neće preći cenu proizvoda koji se koristi. Kupac snosi celokupan rizik skladištenja, upotrebe, ili aplikacije ovog proizvoda. Roba se prodaje kao predmet standarda i uslova prodaje Yare, standardi i uslovi su dostupni na zahtev, ili se mogu naći na internet stranici www.yaravita.com. Upotreba proizvoda implicira da kupac prihvata uslove prodaje.