



YaraVita™
Mantrac® Pro

Mantrac® Pro

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták

KFV 1(C)(II)(a) Jednozložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami
Kapalná suspenze

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

27,8% (= 508 g/l) Celkový obsah manganu (Mn) jako uhličitán

Rovněž obsahuje:

3,8 % (= 69 g/l) Celkový dusík (N)

[3,8 % močovinnového dusíku]

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050; email: hnojiva@yara.com

www.yaraagri.cz

HU FIGYELEM !

Felhasználás előtt olvassa el a címke utasításait!

PFC 1(C)(II)(a) Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervesetlen trágya
Folyékony szuszpenzió

Tartalom % w/w:

27,8% (= 508 g/l) Összes mangán (Mn) karbonát formájában

Tartalmaz még % w/w:

3,8% (= 69 g/l) Összes nitrogén (N)

[3,8% karbamid-nitrogén]

Importálta: **Yara Hungária Kft.** 8200 Veszprém, Szabadság tér 4., Magyarország.

Tel: +3615009409

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

PFC 1(C)(II)(a) Jednozložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny
Kvapalná suspenzia

Obsah % hmotnosti:

27,8% (= 508 g/l) Celkového mangán (Mn) ako uhličitán

Obsahuje tiež:

3,8% (= 69 g/l) Celkového dusíka (N)

[3,8% močovinnový dusík]

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz

Distribútor: **LEGUSEM p.č., a.s.**, Partizánska 401 ,916 24 Horná Streda,

Slovenská republika. Tel: +421 32 777 38 58

5L
Čistá hmotnosť
Nettó tömeg
9,14 kg

YaraVita™ Mantrac® Pro

CZ

Složení: Uhlíčitán manganatý CAS n° 598-62-9 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), močovina CAS n° 57-13-6 (KSM 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz obal

HU

Összetevők: mangán-karbonát CAS n° 598-62-9 (CMC 1: összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek), karbamid CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt adagolást. Ez a műtrágya karbamidot tartalmaz, amely ammóniát szabadíthat fel, és hatással van a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő kármentesítési intézkedéseket kell tenni.

Tételszám/ Gyártás dátuma: Lásd a csomagolást

SK

Zloženie: Uhlíčitán mangánu CAS n° 598-62-9 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), močovina CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok je potrebné prijať vhodné sanačné opatrenia.

Číslo šarže/ Dátum výroby: Pozri vrchnú časť balenia

Výrobce/ Gyártó:

Yara UK Ltd., Manor Place, Pocklington, York,
YO42 1DN, UK.

Tel: +44 1759 302545 Web: www.yara.com

CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro podrobnější informace ohledně aplikací v jednotlivých plodinách kontaktujte společnost Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Obiloviny: 1 l/ha od stádia 2 listů do doby nahmatání 2.

Kolénka (Zadok's G.S 12 až 31), v případě středního až velkého deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha. U ozimů je velmi výhodná aplikace před zimní dormancí.

Jablone: 1 až 1,5 l/ha před kvetením v případě velkého deficitu.

* Nebo po odkvetu a opakovat v intervalu 10 - 14 dní.

Objem vody: 200 až 1.000 l/ha

* U odrůd citlivých na strupovitost, oddálit první aplikaci až na 6 týdnů po kvetení.

Brambory: 1 až 2 l/ha týden po 100% vzejití. Pro střední a silné deficity opakovat aplikaci ve intervalu 10 - 14 dní.

Dávka vody: 200 l/ha.

Hrách/luskoviny: 1 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů (deficit/výnos). Dávka vody: 200 l/ha

Cukrovka: 1 až 2 l/ha ve fázi od 4 do 6 listů. V případě středního až velkého deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

Kukuřice: 1 až 2 l/ha ve fázi od 4 až 6 listů. V případě středního až velkého deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

Řepka: Při jedné aplikaci 1 l/ha na začátku dlouhivého růstu.

Pro střední nedostatky 1 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů a na začátku dlouhivého růstu. Při silném deficitu lze opakovat za 10 až 14 dní. Neaplikovat při kvetení!

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.



Další rady a informace o produktu získáte QR kód pomocí chytrého telefonu



HU/SK

WILCZYP75M01 V05.23

YaraVita™ Mantrac® Pro

CZ POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TĚTO ETIKETĚ

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodu a aplikujte při zapnutém míchání.

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měly(i) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případně kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě anebo na www.yaraagri.cz. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. Další informace naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.yara.com.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a zvířat. Chrňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními (-5°C < a < 35°C). Likvidujte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

HU

Csak professzionális használatra.
További konkrét javaslatokért forduljon a Yara-hoz.

A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA

Almafélék: Szíromhullástól kezdve 10-14 napos ismétléssel kezeljük az ültetvényt 0,5-1 l/ha adagban, maximum 3 alkalommal. Erős hiánytüneteknél * 1 l/ha dózisban a virágzásig alkalmazható. Víz mennyiség: 400-1000 l/ha. * Parásodásra hajlamos fajták esetén a kezelést a virágzás utáni hatodik héttől kezdjük.

Bab: 4-6 leveles állapotban 1,0 l/ha dózissal jutassuk ki. A foltbetegségek megelőzésére 1,0-1,5 l/ha virágzás kezdetén és végén. Víz mennyiség: 400-600 l/ha.

Burgonya félék: teljes kelés után egy héttel 1,0 l/ha dózisban. Közepes vagy erős hiány tüneteknél 10-14 naponként ismételjék meg a kezelést.

Víz mennyiség: 200 l/ha

Cukorrépa: 4-6 leveles korban 1,0 l/ha dózisban jutassuk ki.

Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjék meg a kezelést. Víz mennyiség: 300-500 l/ha.

Kalászosok: 1 l/ha dózisban alkalmazzuk kétleveles állapotól az első nódusz megjelenéséig (Zadok 12-31 fenológia). Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjék meg a kezelést. Víz mennyiség: 200-400 l/ha.

Kukorica: 4-8 leveles állapotban 1 l/ha dózisban kezeljük. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjék meg a kezelést. Víz mennyiség: 200-400 l/ha.

Repce: A szármegnyúlás időszakában 1,0 l/ha dózissal kezeljük az állományt. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjék meg a kezelést. Virágzáskor ne alkalmazzuk. Víz mennyiség: 200-400 l/ha.

Szőlő: 1,0 l/ha dózissal kezeljük az állományt, a virággrügyek megjelenésekor majd a második kezelést terméskötődéskor végezzük el. Víz mennyiség: 500-1000 l/ha.



További tanácsokért és
termékinformációkért kérjük,
szkennelje be a kódestelefonjával

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDIG KÖVESSE A CÍMKE UTASÍTÁSAIT

Felhasználás előtt alaposan felrágandó. Töltse fel a permetezőgépgé tartályát háromnegyed részig és állandó keverés közben adja hozzá a lombtrágyát a bemosó tartályon keresztül, majd adja hozzá a maradék vízmennyiséget és folytassa a keverést a permetezés végéig.

KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS

Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a használati utasításokat! Az együttes alkalmazás kockázatait teljes mértékben a végfelhasználó vállalja. Termékek együttes alkalmazása előtt Ön vagy szaktanácsadója keresse fel a www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információkat talál. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yara kollégájával szaktanácsért.

FIGYELMEZTETÉS

Csak a felhasználási útmutatóban javasolt növényekre alkalmazza. Ne használja a terméket extrém időjárás viszonyok között, melyek gyors, vagy különösen lassú száradást okoznak, továbbá fagy és eső esetén, vagy ha az előreljelzés alapján fagy, vagy eső várható. Viseljen megfelelő kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat előtt tisztítson meg minden eszközt. További információkért tekintse meg az biztonságtechnikai adatlapot, amely a www.yara.hu oldalon érhető el.

TÁROLÁS

Tárolja hőszigetelt, száraz növényvédőszer raktárban.

YaraVita™ Mantrac® Pro

Gyermektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Óvja a fagytól és szélsőséges időjárási körülményektől (<-5°C és <35°C) Tartsa be a kiürült csomagolóanyag kezelésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásokat.

ÉRTEKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Ez a termék az eladó értékesítési feltételei alapján kerül eladásra, kérés alapján a vonatkozó eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használatra feltételek, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket

SK

Len na profesionálne použitie.

Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Cukrová repa: 1 až 2 l/ha od fázy 4 až 6 prvých listov. V prípade stredného až veľkého deficitu opakovať v intervale 10-14 dní. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

Jahody (poľné): 1 l/ha vo fáze zelených pukov. V prípade potreby opakujte v 10 až 14 denných intervaloch. Dávka vody 30 až 500 l/ha.

Karfiol: 1 l/ha od fázy 4. Listu. V prípade stredného alebo silného nedostatku opakujte aplikáciu v 10-14 dennom intervale. Dávka vody: 200 l/ha.

Mrkva, karotka: 1-2 l/ha pri výške porastu 15 cm. V prípade silného nedostatku Mn, opakujte aplikácie po 7-14 dňoch. Dávka vody: 200 l/ha.

Obilniny: 1 l/ha od štádia 2 listov do fázy objavenia 1.kolienka (Zadok G.S. 12 až 31). V prípade stredného až veľkého deficitu opakovať aplikáciu v 10 až 14 denných intervaloch. Pri ozimínach je veľmi výhodná aplikácia pred zimnou dormanciou. Dávka vody: 200 l/ha.

Paprika (poľná kultúra): 1 l/ha od fázy 4.-6. listu. V prípade stredného až vysokého nedostatku aplikujte aplikáciu v 10-14 denných intervaloch. Dávka vody: 200-500 l/ha.

Pšenica: 0,5 l/ha od štádia 2 listov do fázy objavenia 1.kolienka (Zadok G.S. 12 až 31). V prípade stredného až veľkého deficitu opakovať aplikáciu v 10 až 14 denných intervaloch. Pri ozimínach je veľmi výhodná aplikácia pred zimnou dormanciou. Dávka vody: 200 l/ha.

Reпка ozimná: Pri jednej aplikácii 1 l/ha na začiatku predĺžovacieho rastu. Pri závažnejšej deficiencii 1 l/ha vo fáze 4 až 6 listov a na začiatku predĺžovacieho rastu. Extra aplikácia môže byť vykonaná po 10 až 14 dňoch pri silnom deficite. Neaplikujte v čase kvetu. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

Salát (poľná kultúra): 1 l/ha 10 – 14 dní po vzidení. V prípade silného nedostatku opakujte aplikáciu po 10-14 dňoch. Dávka vody: 200 l/ha.

Poznámka: Aplikácie ukončíte mesiac pred zberom.

Zemiaky: 1 až 2 l/ha týždeň po 100% vzidení. Pri strednom a silnom deficite opakujte aplikácie v 10 až 14 denných intervaloch. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.



Ak QR chcete získať ďalšie rady a informácie o produkte, naskenujte pomocou svojho smartfónu

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné pripravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môžu ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tank-mix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické doporučenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.yara.com.

SKLADOVANIE

Uchovávaťe v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chránite pred extrémnymi teplotami (<-5°C a <35°C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tento produkt sa predáva v súlade s obchodnými podmienkami predajcu, ktoré sú k dispozícii na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.

