



Yara Vita™
Seniphos™



1 litro

Contenido neto 1.25 kg
www.yara.com.mx

AVISO

Lea la etiqueta antes de utilizar el producto
Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

FAVOR de AGITARSE ANTES de USAR.

Fertilizante Foliar Líquido: NITRÓGENO, FÓSFORO, CALCIO

Análisis garantizado:

NITRÓGENO 3% p/p equivalente

39 g/L de Nitrógeno (N)

FÓSFORO 23% p/p equivalente

310 g/L de Fosfato (P2O5)

CALCIO 3% p/p equivalente

40 g/L de Calcio (Ca)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No se almacene junto a productos alimenticios. No se reutilice este envase, destruyase. No se deje alcance de los niños.

Número Registro CICOPLAFEST: RSCO-041/IV/10

Hecho en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por Yara UK Ltd., York YO42 1DN, Reino Unido.

Tel. +44 1759 30 25 45.

Importado, almacenado y distribuido por:

YARA MEXICO S DE RL DE CV.

Avenida Américas 1545, piso 24, Col. Providencia 1ª 2ª y 3ª Sección, CP: 44630. Guadalajara, Jalisco, México.

01 800 112 92 72



Peligro

H290: Puede ser corrosivo para los metales. H302: Nocivo en caso de ingestión. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P280: Llevar guantes y gafas de protección. P260: No respirar el gas, los vapores o el aerosol.

P305+P351+P338+P310: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua. P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Albaricoque, Ciruelos, Melocotón, Nectarinos: 2-5 aplicaciones a 10 l/ha desde caída de pétalos en intervalos de 7-14 días. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Aguaate: Dos a cinco aplicaciones a 5 a 10 l/ha en intervalos de 7 a 14 días desde caída de pétalos. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Algodón: 4 l/ha desde 10% de floración repetido en intervalos de 14 días según necesidad. Volumen de agua mínimo: 300 l/ha.

Berenjena (En Campo): 2 a 3 aplicaciones de 5 l/ha en intervalos de 10-20 días, comenzando en cuajado del fruto. Volumen de agua: mínimo 500 l/ha.

Calabacín (En Campo): Aplicar entre 3 a 5 aplicaciones a 5 l/ha en intervalos de 7 días comenzando en cuajado de la fruta. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Cebolla (En Campo): Uno o dos aplicaciones a 5 l/ha durante el engorde del bulbo en un intervalo de 10 a 14 días. Volumen de agua: 75 a 200 l/ha.

Cereales: Aplicar 5 l/ha en macollamiento. Repetir en intervalos de 10 a 14 días si es necesario. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Cereza: Dos a cinco aplicaciones a 10 l/ha (o 3 aplicaciones a 12.5 l/ha) en intervalos de 7 a 14 días desde caída de pétalos. Volumen de agua: 500 a 1000 l/ha.

Citrícos: 10 l/ha al cuajado de la fruta. Repetir a la misma dosis en intervalos de 10-14 días hasta 2 veces. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Fresa (En Campo): En variedades de ciclo corto aplicar 3 x 10 l/ha desde comienzo de floración en intervalos de 7-10 días. En variedades de ciclo largo aplicar 6 x 5 l/ha desde el inicio de floración en intervalos de 10-14 días. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Manzana: Entre 3 a 8 aplicaciones a 10 l/ha en intervalos de 10-14 días desde la caída de los pétalos. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Maíz: 5 l/ha a 4-8 hojas. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Melón (En Campo): 3-5 l/ha al inicio de la floración. Repetir en intervalos de 10-14 días si es necesario. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Papa: Para aumentar el número de tubérculos aplicar de 10 l/ha hasta 15 l/ha a la iniciación de tuberización (cuando el 50% de los abultamientos de las raíces tienen el doble de diámetro que un estolón normal). Para aumentar el tamaño de los tubérculos realizar 2 aplicaciones a 5 l/ha hasta 10 l/ha durante el engorde (cuando los primeros tubérculos tienen como mínimo 10 mm de diámetro) con un intervalo de 10 a 14 días entre las aplicaciones. Volumen de agua mínimo: 75 l/ha.

Pimiento (En Campo): Hasta 4 aplicaciones de 5 l/ha comenzando desde floración del segundo racimo repetido en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Pepino (En Campo): Aplicar entre 3 a 5 aplicaciones a 5 l/ha en intervalos de 7 días comenzando en cuajado de la fruta. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Tomates (En Campo): 5 l/ha desde 4 a 6 hojas en intervalos de 10-14 días. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Uvas: 10 l/ha al cuajado de la fruta, repetir hasta 2 a 4 veces en intervalos de 10 días. Volumen de agua: 500 l/ha.

Zanahoria: 5 l/ha. 2 a 3 aplicaciones desde cuando el cultivo mide 15 cm de altura en intervalos de 7 a 10 días. Volumen de agua: 200 l/ha.

CULTIVOS PROTEGIDOS

Usar como concentración máxima 0,5 litro por 100 litros de agua. Máximo volumen de agua: 1.000 l/ha. Para el momento de aplicación seguir las recomendaciones dadas en este misma etiqueta para cada cultivo en campo abierto.

INSTRUCCIONES DE USO

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
"RESPECTE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"

"MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD"
"RESPECTE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS"
"NO TIRE LOS ENVASES VACIOS DEL PRODUCTO ENSUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS, U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"

"RESPECTE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO"

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLÁ EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < and <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

V/1,23

WLMXYPAMM01