



YaraVita™  
OPTINUE™

## AVVISO

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l'etichetta.

## PFC 1(C)(II)(b) CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI

Sospensione liquida

Tenore dichiarato di nutrienti in massa:

1% (= 12 g/l) **Manganese (Mn)** come solfato, totale  
1% (= 12 g/l) **Zinco (Zn)** come solfato, totale

Contiene anche:

2% (=24 g/l) **Azoto (N)** totale

**Ingredienti:** Leonardite n° CAS 1415-93-6 (CMC 1:  
Sostanze e miscele a base di materiale grezzo).

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.  
Non superare le dosi di applicazione.

Numero di lotto/ Data di produzione: Vedere la confezione

Contiene acidi umici e fulvici

**NUMERO DI EMERGENZA: +39 02 75416333**

Fabbricante: **Yara Italia S.p.A.**, Via Benigno Crespi 57,  
20159 Milano- Italia  
Tel: +39 02 754 161 [www.yara.it](http://www.yara.it)  
Prodotto da: **Yara UK Ltd.**, Pocklington, York, YO42 1DN,  
United Kingdom.

## DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

**Pomacee (melo, pero):** 2-4 l/ha al suolo a inizio ciclo vegetativo, eventualmente ripetuti a 2-3 settimane di distanza. Ulteriore intervento 2-4 l/ha al suolo in post allegagione. Fogliare 1-2 trattamenti a 1-2 l/ha in pre-fioritura. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Drupacee (pesco, albicocco, susino, nettarina, ciliegio):** 2-4 l/ha al suolo a inizio ciclo vegetativo, eventualmente ripetuti a 2-3 settimane di distanza. Ulteriore intervento 2-4 l/ha al suolo in post allegagione. Fogliare 1-2 trattamenti a 1-2 l/ha in pre-allegagione. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Uva (da tavola e da vino):** 2-4 l/ha al suolo a inizio ciclo vegetativo, eventualmente ripetuti a 2-3 settimane di distanza. Ulteriore intervento 2-4 l/ha al suolo in post allegagione. Fogliare 1-2 trattamenti a 1-2 l/ha in pre-fioritura. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Orticole a frutto (pomodoro da industria e da mensa, melanzana, zucchini, peperone):** 2-4 l/ha al trapianto, ripetere eventualmente ogni 2-3 settimane per 2-4 applicazioni. Fogliare, 1-2 l/ha da piante alte 10-20 cm, da ripetere dopo 2 settimane. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Orticole a foglia:** 2-4 l/ha al suolo in post-trapianto, ripetere dopo ogni 2-3 settimane per 2-4 volte. Fogliare, 1-2 l/ha. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Patata, carota:** 2-4 l/ha in pre-emergenza, ripetere eventualmente ogni 2-3 settimane per 2-4 applicazioni. Fogliare, 1-2 l/ha da piante alte 10-20 cm, da ripetere dopo 2 settimane. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Brassicacee:** 2-4 l/ha al trapianto, ripetere eventualmente ogni 2-3 settimane per 2-4 applicazioni. Fogliare, 1-2 l/ha da piante alte 10-20 cm, da ripetere dopo 2 settimane. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Frumento:** fogliare, 1-2 l/ha in fase di accostimento (anche con erbicida), 1-2 l/ha in fase di foglia bandiera (anche con fungicida). Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

**Culture protette:** in fertirrigazione, 2-4 l/ha dopo il trapianto e ogni 3-4 settimane per 3-5 volte. Volume d'acqua minimo: 200 l/ha.

## ISTRUZIONI PER L'USO SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad agitare finché la miscela non è pronta.

## TANKMIX/MISCELAZIONE

Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d'uso. La miscelazione è interamente a rischio dell'utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l'utilizzatore o il consulente devono visitare [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) per le informazioni importanti. In alternativa, contattare Yara per consigli specifici.

## PRECAUZIONI

Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Pulire tutta l'attrezzatura prima e dopo l'uso.

## STOCAGGIO

Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre condizioni estreme (temperature superiori a 40°C). È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali.

## CONDIZIONI DI VENDITA

Questo Prodotto è soggetto ai Termini e Condizioni di Vendita del venditore, disponibili su richiesta. L'uso del prodotto implica l'accettazione da parte del compratore dei Termini e Condizioni di Vendita.



UFI: RYSO-80WR-000T-G5FW

## Pericolo

Ingredienti pericolosi: Leonardite, solfato di manganese, solfato di Zinco (anidro) massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie.

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280: Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi.

P261: Evitare di respirare i gas o i vapori. P305+P351+P338+ P310: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.

