



YaraVitaTM
MagtracTM

Contiene
300 g/l de Magnesio (Mg)
Suspensión Concentrada

Producto registrado en el MAGAP No. 03343392

Consérvese en un lugar cerrado, fuera del alcance de los niños

Importado y Comercializado por:
YARECUADOR CIA LTDA
Km 1.5 vía a Samborondón
Edificio Del Portal oficina 107
Teléfono: +(593) 4 4545607
consultasecuador@yara.com www.yara.com.ec
Fabricado por: Yara UK Ltda, York YO42 1DN, Inglaterra

1 litro
Peso neto
1,50 kg

Nº de Lote: xxxxxx
Fecha de Fabricación: xx/xx/xxxx
Fecha de Caducidad: xx/xx/xxxx

AVISO
Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Fertilizante foliar de Magnesio

RECOMENDACIONES DE USO

Banano: 1 – 2 l/ha. Repetir en caso que se necesite, cada 2 semanas. (se recomienda aplicar en intervalos mínimos de 4 semanas, en caso que se necesite).
Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Brócoli, Col, Coliflor: 4 l/ha a 4-6 hojas. Se puede repetir a la misma dosis en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.
Volumen mínimo de agua: 75 l/ha.

Citricos: 4 l/ha desde 2/3 desarrollo de las nuevas hojas en cada brotación. En caso de necesidad repetir en intervalos de 10-14 días a la misma dosis. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Claveles (En Campo): 2 l/ha en 1.000 l/ha de agua. Aplicar 2 semanas después del trasplante, 14 días más tarde y a partir de la primera cosecha importante (cuando todas las flores han sido cosechadas). Evitar aplicar en floración.

Lechuga (En Campo): 4 l/ha. 10 a 14 días del trasplante o de la emergencia. Se puede repetir en caso de necesidad a la misma dosis en intervalos de 10-14 días. *NB La última aplicación debe ser no menos que 1 mes antes de la cosecha.*
Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Maíz: 4 l/ha a 4-8 hojas. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Melón (En Campo): 4 l/ha a 4-6 hojas. Se puede repetir a la misma dosis en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad.
Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Palmitos: 4 l/ha. Se debe aplicar una vez al inicio del brote o cuando los brotes tiernos estén entre los 20 y 30 días.
Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Papas: 4 l/ha. 1 semana después de 100% emergencia. En caso de grave necesidad repetir a la misma dosis en intervalo de 10 a 14 días. Volumen mínimo de agua: 75 l/ha.

Pimiento (En Campo): 4 l/ha a 4-6 hojas repetido a la misma dosis según la necesidad en intervalos de 10 a 14 días.
Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Tomate (En Campo): 4 l/ha. Desde 4 a 6 hojas en intervalos de 10-14 días según la necesidad.
Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

CULTIVOS PROTEGIDOS (DE INVERNADERO): 0,2 litros cada 100 litros de agua concentración máxima. Volumen de agua: 1.000 l/ha máximo. Leer la recomendación del cultivo específico listado en este etiqueta para ver el momento de aplicar. *NB. Magtrac puede dejar un residuo blanco. Evitar aplicaciones en menos que un mes antes de la cosecha.*

Para mayor información consulte a un técnico profesional

INSTRUCCIONES PARA SU USO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA. *Agitar el envase fuertemente* antes de usarlo. Verter el producto a través de un filtro al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN TANQUE/CON APLICACION

Lea con mucha atención TODAS las etiquetas y cumpla estrictamente con las instrucciones de uso y los consejos con referencia a si el/los producto/s debería/n ser coaplicados. Existen muchas variables, que quedan fuera del control de Yara, que pueden influir en el rendimiento de los productos coaplicados, por lo que la coaplicación corre a riesgo del usuario final. Se recomienda con insistencia que al utilizar mezclas de productos desconocidos se realice una aplicación limitada inicialmente. Antes de coaplicar productos ud. O su asesor deberán visitar www.tankmix.com para consultar información importante. Si no, diríjase a Yara para solicitar consejos específicos.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperan heladas o lluvia. Lleve guantes y mascarera protectora adecuada al manejar este producto. Limpie todo el equipo después del uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. *Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C)*

CONDICIONES DE VENTA – GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Yara garantiza que el producto en el recipiente sin abrir cumple con la descripción química indicada en esta etiqueta. Deben seguirse con mucha atención las instrucciones de esta etiqueta, las cuales se basan en pruebas que se consideran fiables. Puesto que las condiciones meteorológicas/de la tierra inusuales y el uso de este producto quedan fuera del control de Yara, no se da garantía explícita o implícita a los efectos de dicho uso ni de los resultados obtenidos, y en ningún caso la responsabilidad de Yara superará el precio del producto usado. El comprador deberá asumir todos los riesgos de almacenamiento, uso o aplicación de este producto. Los productos se venden sujetos a las Condiciones de venta normales de Yara; disponibles a petición del cliente. El uso del producto implica que el comprador acepta estas Condiciones de venta.