



YaraVita™
Magzibor™

AVISO

Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto

Magzibor™

Fertilizante foliar de magnesio, zinc y boro con nitrógeno

Contiene

69 g/l de Nitrógeno (N)

116 g/l de Óxido de Magnesio (MgO)

70 g/l de Boro (B)

140 g/l de Zinc (Zn)

Suspensión Concentrada

Producto registrado en el MAGAP No. 033431342

Consérvese en un lugar cerrado, fuera del alcance de los niños

Importado y Comercializado por:

YARECUADOR CIA LTDA

Km 1.5 vía a Samborondón

Edificio Del Portal oficina 107

Teléfono: +593 43 9028 00

consultasecuador@yara.com

www.yara.com.ec

Fabricado por: Yara UK Ltda, York YO42 1DN, Inglaterra

10 litros


Peso neto
14.43 kg

Nº de Lote: xxxxxx PVP:\$ XX.XX

Fecha de Fabricación: xx/xx/xxxx

Fecha de Caducidad: xx/xx/xxxx

YaraVita Magzibor™



UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Boric acid, zinc salt)

Atención

Ingredientes peligrosos: ácido bórico, sal de cinc

H361: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:
Consultar a un médico.

P391: Recoger el vertido.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en según los reglamentos locales.

YaraVita Magzibor™

RECOMENDACIONES DE USO

Arroz: 2-3 l/ha entre 25 y 30 días después de la emergencia. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.

Banana: 1-2 l/ha aplicar al inicio del flujo de crecimiento cada año. Repetir en intervalos de 14 días en caso de necesidad hasta un mes antes de la cosecha. Volumen mínimo de agua: 20 l/ha.

Café: 1-3 l/ha a partir del inicio de brotación. Repetir en caso de necesidad después del cuajado de la fruta. Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.

Cítricos: 2 a 5 l/ha en la primera brotación, al cuajado de la fruta y en la segunda brotación. Volumen mínimo de agua: 500 l/ha.

Maíz: 2 a 4 l/ha en 4 a 8 hojas. Repetir en caso de necesidad en intervalos de 10-14 días hasta 2 veces. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

Para mayor información consulte a un técnico profesional

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Vierta el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Solo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.