YaraVita Zintrac™

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Arándano: Aplicar 1 l/ha antes de la caída de hojas y repetir en separación de las yemas el primavera de la siguiente temporada. Volumen de agua: mínimo 200 l/ha.
Ajo: 0.25 a 1 l/ha cuando exista suficiente área para interceptar la aspersión. Volumen de agua 50 a 200 l/ha.
Arroz: 1 l/ha al inicio del macollaje. Volumen de agua mínimo: 50 l/ha.
Café: 1 l/ha aplicado en brotación y en intervalo de 10-14 días, antes de floración. En caso de deficiencia grave se puede aplicar además durante el desarrollo de los granos a la misma dosis.
Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.
Cebolla : 0.25 a 1 l/ha cuando exista suficiente área para interceptar la aspersión. Volumen de agua 30 a 200 l/ha.
Cereales: 1 a 2 l/ha a partir de 2 hojas hasta segundo nudo detectable (Zadok G.S 12 a 32), repetir una o dos veces a intervalos de a 14 días en caso de moderada a severa deficiencia. Volumen de agua 200 l/ha.
Espárrago: 1 l/ha al principio del crecimiento vegetal cuando hay suficiente superficie foliar para recibir el producto. Volumen de agua; 200 l/ha.
Maíz: 0,3-1 l/ha. Aplicar a partir de 3 a 8 hojas, pudiendo repetir entre 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.
Mango: 1 l/ha al inicio de brotación y otra vez pre-floración.
Volumen mínimo de agua: 400 l/ha.

Manzano y peral: Aplicar 0,75-1 l/ha a partir de apertura de yemas y después de floración. No aplicar durante floración. Repetir en dosis de 0,5 l/ha a partir de 6 semanas después de caída de pétalos. En post cosecha aplicar en dosis de 1,5 a 2 l/ha durante los 30 días que anteceden al inicio de caída de hojas. En variedades sensibles a Russet se recomienda realizar la aplicación post cosecha en dosis de 1,5 a 2 l/ha y repetir en primavera a partir de 6 semanas después de caída de pétalos en dosis de 0,5 l/ha.
Volumen mínimo de agua: 200 l/ha.
Olivo: 1 l/ha aplicado en brotación y repetir en apertura del cáliz.
Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.
Palto: 1-2 l/ha. Realizar las aplicaciones con brotes rojos de primavera, pudiendo repetir durante el inicio del crecimiento de brotes de verano.
Volumen de agua mínimo: 30 l/ha.
Papas: 1 l/ha. Aplicar una semana después de que ha emergido el 100% del cultivo. Con deficiencias moderadas repetir 10 a 14 días después.
Volumen de agua mínimo: 50 l/ha.
Uva de Mesa: Uva vinífera: una o dos aplicaciones de 1 l/ha aplicado durante el crecimiento de brotes antes de floración, dejando 7 a 10 días de intervalo entre las aplicaciones. Repita en cuaja si es necesario. También 1 a 2 l/ha después de la cosecha antes de la senescencia de las hojas.
Volumen de agua 200 l/ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse.
Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

For Marketing Purposes Only

WLPEYP48M01 V.07.21