

YaraVita Magtrac™

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Arándano: 4 l/ha, 10 días después que la caída de pétalos haya terminado. En caso de ser necesario, Repetir 10 a 14 días después. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha.

Volumen de agua: 1000 l/ha.

Cereales: 2-4 l/ha. Aplicar a partir de 2 hojas hasta el primer nudo detectable (etapa de Zadok entre 12 a 31). Con deficiencias severas repetir la aplicación entre 10 a 14 días después. Es posible realizar una tercera aplicación en la etapa de hoja bandera hasta anthesis.

Volumen de agua: 30 a 200 l/ha.

Cítrico: 2-4 l/ha. Aplicar al inicio de crecimiento de brotes en primavera y repetir 20 a 30 días después. Con deficiencias severas repetir durante el crecimiento de verano y repetir 20 a 30 días después. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Espárrago: Hasta cinco aplicaciones a 2-4 l/ha durante el crecimiento vegetativo en intervalos de 10-14 días.

Volumen de agua: 50 a 200 l/ha.

Fresa (en campo): 3-4 l/ha. Aplicar en yemas verdes, pudiendo repetir entre 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Mango: Hasta 4 aplicaciones de 2-4 l/ha durante brotación de primavera. Volumen de agua: 500-1000 l/ha.

Manzano, Peral: 2-4 l/ha. Aplicar hasta botón floral y repetir en caída de pétalos. En variedades susceptibles a russet, aplicar a partir de 6 semanas después la caída de pétalos.

Volumen de agua mínimo: 1.000-1.500 l/ha.

Maíz: Aplicar 2 a 4 l/ha con plantas entre 4 a 8 hojas. Volumen de agua sugerido: 30 a 200 l/ha.

Palto: 4 l/ha durante el flush de crecimiento de primavera y repetir durante el flush de otoño. Volumen de agua: 200 a 1.000 l/ha.

Papa: 4 l/ha. Aplicar una semana después de 100% emergencia.

Con deficiencias moderadas repetir la aplicación 10 a 14 días después. Volumen de agua mínimo: 50 l/ha.

Tomate (en campo): 4 l/ha. Aplicar a partir de 4 a 6 hojas, repetir si es necesario entre 10 a 14 días después.

Volumen de agua mínimo: 500 l/ha

Uva de mesa, Uva vinífera: 3-4 l/ha. Comenzar las aplicaciones con brotes de 30 cm y repetir inmediatamente antes de la floración. A partir de frutos cuajado realizar 1 a 3 aplicaciones hasta bayas de 5-7 mm. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.