

YaraVita Futrel™

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Arándano: Aplicar 5 l/ha al inicio del crecimiento de los brotes, pudiendo repetir dos veces a intervalos de 10 a 14 días.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Espárragos: 1-2 l/ha cuando haya suficiente superficie foliar, a intervalos de 10 días antes de la senescencia de las hojas.

Volumen de agua: 30-200 l/ha.

Mango: 5 l/ha durante periodos de crecimiento vegetal.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Manzano, Peral: aplicar 5 a 10 l/ha en brotación. También aplicar 2 a 5 veces en dosis de 5-10 l/ha, a intervalos de 10 a 14 días, a partir de frutos de 20 mm en adelante. No aplicar durante los 30 días que anteceden al inicio de la cosecha.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Melón, Sandía, Pepino, Zapallo Italiano (en campo): Realizar 3 aplicaciones de 2,5 a 5 l/ha a partir de inicios de floración a intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha. Volumen de agua 200 l/ha

Palto: 5 l/ha durante periodos de crecimiento vegetal.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Pimiento (en campo): Realizar 3 aplicaciones de 2,5 a 5 l/ha a partir de inicios de floración a intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha.

Volumen de agua 200 l/ha

Tomate (en campo): Realizar 3 aplicaciones de 2,5 a 5 l/ha a partir de inicios de floración a intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha.

Volumen de agua 200 l/ha

Uva de mesa, Uva vinífera: Realizar 3 aplicaciones a 2,5 hasta 5 l/ha a partir de inicio de floración en intervalos de 10 a 14 días. No aplicar con frutos de más de 5 mm.

Volumen de agua: 200 l/ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.