

YaraVita Potash Advance™

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Cereales: 5 l/ha desde mitad del macollaje hasta el segundo nudo (Zadoks G.S. 25 a 32). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad. Volumen de agua: 200 l/ha. Aplicación vía aérea: 3 l/ha desde mitad del macollaje hasta el segundo nudo (Zadoks G.S. 25 a 32). Se puede repetir en intervalos de 10-14 días en caso de necesidad. Volumen de agua: 20 a 50 l/ha.

Cucurbitáceas en campo (Sandías/melones/zapallo/zapallo italiano): 3 a 5 l/ha en intervalos de 10 días desde el inicio del desarrollo de la primera fruta. Volumen de agua: 500 l/ha.

Fertiliego Todos los cultivos: Usar una solución de 0,05% v/v (0,5 litro por cada 1.000 litros agua).

Repetir en intervalos de 7 a 14 días según necesidad.

Duraznero: 3 aplicaciones de 3 a 5 l/ha a partir de endurecimiento de carozo, repitiendo con intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Espárrago: 3 a 5 l/ha antes de la senectud de las hojas. Volumen de agua: 200 l/ha

Fresa (en campo): 5 l/ha después de la floración, repetir si es necesario en intervalos de 7 a 10 días.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Hortalizas de hojas (en campo): 5 l/ha 14 a 20 días después la 4 a 6 hojas. Se puede repetir si necesario en intervalos de 10 días. No aplicar a partir de un mes antes de la cosecha.

Volumen de agua: 500 l/ha.

Mango: 2 l/ha en crecimiento de frutos aplicar 1 a 3 veces, en intervalos de 14 a 21 días, según necesidad. Volumen de agua: 500 to 1000 l/ha. No se aplica dentro de 10 días después de una aplicación de aceite mineral.

Manzano, Peral: 1 a 2 aplicaciones de 2 a 3 l/ha comenzando a partir de frutos de 20 mm con intervalos de 10 a 14 días. Las aplicaciones posteriores pueden ser realizadas en dosis de 5 l por ha. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Olivo: aplicar 3 a 5 l/ha a comienzo de la cuaja. Repetir a intervalos de 10 a 14 días si es necesario. Volumen de agua: 500 a 1000 l/ha.

Palito: 3 l/ha en crecimiento de frutos aplicar 1 a 3 veces, en intervalos de 10 a 14 días, según necesidad. Volumen de agua: 500 to 1000 l/ha.

Papa: aplicar 3 a 5 l/ha durante el llenado de tubérculos, repetir en intervalos de 7 a 14 días en caso de necesidad. Volumen de agua 200 a 500 l/ha. En aplicaciones aéreas aplicar 3 l/ha en los momentos descritos. Volumen de agua 20 a 50 l/ha.

Pimiento (en campo): realizar 1 a 4 aplicaciones a intervalos de 10 a 14 días, en dosis de 5 l/ha, a partir del cuajado del fruto de la segunda emisión de flores. Volumen de agua 50 a 500 l/ha.

Tomate (en campo): 3 l/ha aplicado después de la cuaja del primer racimo pudiendo repetir a intervalos de 10 días.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha.

Uva de Mesa: Uva Vinifera: 3 a 5 l/ha a partir de brotes de 30 cms hasta antes de floración, es posible repetir dentro de estos estados en intervalos de 10 a 14 días. Repetir en frutos cuajados, bayas tamaño arveja e inicio de pinta. Volumen de agua mínimo: 500 l/ha.

Los productos YaraVita se fabrican utilizando únicamente aquellos ingredientes activos procedentes de materias de trazabilidad contrastada, con los menores contenidos de metales pesados posibles, que satisfacen los rigurosos requisitos de legislación a nivel mundial.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando este tenga tres cuartas partes de agua y a continuación llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante el tratamiento.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y mascar protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y otros extremos climáticos (temperaturas superiores a 40°C) Disponer de los contenidos y envases en conformidad con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.