



# YaraVita™

## Phosamco SP™

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα  
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

Λίπασμα ΕΚ

Λίπασμα ΝΡΚ με θρεπτικά ιχνοστοιχεία

Εγγυημένη ανάλυση:

**20% άζωτο (N)** ολικό  
[2.6% νιτρικό άζωτο, 0.2% αμμωνιακό άζωτο, 17.2% ουρικό άζωτο],  
**8% πεντοξείδιο του φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)** [3.5% φώσφορος (P)]  
διαλυτό σε ουδέτερο κτρικό αμμώνιο και σε νερό,  
**14% οξείδιο του καλίου (K<sub>2</sub>O)** [11.6% κάλιο (K)] υδατοδιαλυτό,  
**2% οξείδιο του μαγνησίου (MgO)** [1.2% μαγνήσιο (Mg)] ολικό,  
**12.5% τριοξείδιο του θείου (SO<sub>3</sub>)** [5% θείο (S)] υδατοδιαλυτό,  
**0.04% βόριο (B)** υδατοδιαλυτό,  
**0.2% χαλκός (Cu)** υδατοδιαλυτό,  
**0.02% σίδηρος (Fe)** υδατοδιαλυτό,  
**0.26% μαγγάνιο (Mn)** υδατοδιαλυτό,  
**0.006% μολυβδαίνιο (Mo)** υδατοδιαλυτό,  
**0.14% ψευδάργυρος (Zn)** υδατοδιαλυτό

Χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ανάγκη. Μην υπερβείτε την κατάλληλη δοσολογία.

## καθαρό βάρος 10 kg

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK  
Tel: 01759 302545  
Διανέμεται από: Yara Ελλάς Α.Ε. Λ. Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη  
Τηλ.: 210 9370355 www.yara.gr  
Lambrou Agro Ltd, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus  
T: 357 22667908 F: 357 22667157  
www.lambrouagro.com.cy

01.05.19

WLGRRP89W00





# YaraVita™

## YaraVita Phosamco SP™

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Πατάτα:** Δόση 250-500 gr/στρ. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Μήλο:** Δόση 500 gr/στρ. στο στάδιο της ανάπτυξης των καρπών. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ.

**Αμπέλι:** Δόση 200gr/στρ. από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι το ξεκίνημα της ανθοφορίας, 250-500 gr/στρ. από την καρποδέση μέχρι το στάδιο του γαλισμάτος. Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Να τηρείται μεσοδιάστημα ψεκασμών από 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ.

**Κεράσι, Ροδάκιο, Νεκταρίνι, Δαμάσκηνο, Βερλίκκο:** Δόση: 500 gr/στρ. στο γλιτρίσμα του κάλυκα. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ.

**Ακτινίδιο:** Δόση 500 gr/στρ. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-200 λίτρα/στρ.

**Τυμάτα (Υπ.), Πιπεριά (Υπ.):** Δόση 500 gr/στρ. από το στάδιο των 4 φύλλων και μετά. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα/στρ.

**Εσπεριδοειδή:** Δόση: 100-200 gr/στρ. Εφαρμογές 1-2 κατά τη διάρκεια του σχημασμού των οφθαλμών και 2-3 εφαρμογές κατά την ανάπτυξη των καρπών. Να τηρείται μεσοδιάστημα ψεκασμών 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ.

**Σταυρανθή (Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι):** Δόση: 500 gr/στρ. από το στάδιο των 4-6 φύλλων. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

**Υδρολίπωση, όλες οι καλλέργειες:** Δόση: 250-500 gr/στρ. με μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών από 10-14 ημέρες, σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των φυτών. Ελάχιστη ποσότητα νερού 100 λίτρα/στρ.

**Καλλέργειες υπό κάλυψη:** Μέγιστη δόση 300 gr/100 λίτρα νερού. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρ. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υπαιθρίες καλλέργειες για το χρόνο εφαρμογής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομιού επαναγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

#### ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδισσόμενη εφαρμογή με άλλα προϊόντα εγκρίνεται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.lanplanx.com](http://www.lanplanx.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ζέσθρας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνωμάτος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

#### ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

01.05.19

WILGRYFBSW01